

## بررسی اثر عصاره رزماری (*Rosmarinus officinalis*) و آویشن شیرازی (*Zataria multiflora*) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد

### ماهی کپورنقره‌ای (*Hypophthalmichthys molitrix*)

یاسمن فهیم دژبان<sup>(۱)\*</sup>؛ عباسعلی مطلبی<sup>(۲)</sup>؛ سید ابراهیم حسینی<sup>(۳)</sup>؛ علی اصغر خانی‌پور<sup>(۴)</sup>؛ مهدی سلطانی<sup>(۵)</sup>؛ قربان زارع گشتی<sup>(۶)</sup> و فرشته خدابنده<sup>(۷)</sup>

Dr.Fahim79@yahoo.com

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، صندوق پستی: ۷۷۵-۱۴۵۱۵

۲- مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران صندوق پستی: ۱۱۶-۱۳۱۸۵

۳، ۴، ۷- مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، بندر انزلی صندوق پستی: ۱۶۵۵-۴۳۱۴۵

۵- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان

تاریخ دریافت: دی ۱۳۹۱ تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۲

### چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی اثر عصاره رزماری *Rosmarinus officinalis* و آویشن شیرازی *Zataria multiflora* بر

میزان پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور نقره‌ای می‌باشد. تیمارهای مورد بررسی عبارتند از:

تیمار ۱- شاهد: گوشت چرخ کرده منجمد در بسته بندی معمولی

تیمار ۲: گوشت چرخ کرده منجمد + آویشن ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم در بسته بندی معمولی

تیمار ۳: گوشت چرخ کرده منجمد + رزماری ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم در بسته بندی معمولی

تیمار ۴: گوشت چرخ کرده منجمد + ترکیب رزماری (۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) و آویشن (۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) در بسته

بندی معمولی

بعد از انجماد سریع نمونه‌ها در فریزر ماریچی با روش انجماد سریع انفرادی، جهت نگهداری به سردخانه با دمای (-۱۸) درجه سانتیگراد انتقال یافتند. مدت زمان نگهداری در سردخانه، و اندازه‌گیری پروفایل اسیدهای چرب بمدت ۶ ماه انجام گرفت که بر اساس جدول زمانی از پیش تعیین شده نمونه‌برداری جهت تعیین و اندازه‌گیری پروفایل اسیدهای چرب، از فاز صفر آغاز سپس در ماه اول در فواصل ده روزه، در ماه دوم ۱۵ روزه و از ماه سوم به بعد بصورت ماهانه صورت گرفت. شناسائی، تعیین و اندازه‌گیری پروفایل اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی انجام شد. در این تحقیق سطوح مختلف اسیدهای چرب اعم از اشباع و غیر اشباع در ۳ تیمار آزمایشی و ۱ تیمار شاهد به شرح ذیل تعیین شدند:

الف: اسیدهای چرب اشباع Saturated Fatty Acid: مرستیک / پالمیتیک / هپتادکانوئیک / استئاریک / آراشیدیک

ب: اسیدهای چرب تک غیر اشباع Mono Unsaturated Fatty Acid: پالمیتوئیک / اولئیک / گادولئیک، ایکوزانوئیک

ج: اسیدهای چرب چند غیر اشباع Poly Unsaturated Fatty Acid: لینولئیک / آلفالینولئیک

د: اسیدهای چرب چند غیر اشباع بلند زنجیره High Unsaturated Fatty Acid: آراشیدونیک / ایکوزاپنتانوئیک اسید / دوکوزاهگزانوئیک اسید با بررسی نتایج حاصل از این تحقیق مشخص گردید نگهداری گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ حاوی عصاره‌های آویشن و رزماری در شرایط انجماد، باعث پایداری اسیدهای چرب گردیده به طوری که در هیچ کدام از اسیدهای چرب اندازه گیری شده روند کاهشی و یا افزایشی معنی‌داری مشاهده نگردیده است. همچنین نتایج به دست آمده از پروفایل اسیدهای چرب و شاخص‌های مربوط به آنها و نیز بررسی آزمون‌های آماری نشان می‌دهند که تیمار حاوی عصاره رزماری، پایداری بیشتری را طی دوره نگهداری در سردخانه (-۱۸) درجه سانتیگراد در مقایسه با نمونه شاهد و سایر تیمارها نشان داده است؛ و در مقایسه با گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ تیمار شده با عصاره رزماری تا انتهای دوره نگهداری ۶ ماه قابل مصرف بودند.

**کلمات کلیدی:** آنتی اکسیدان، گیاهان دارویی، فرآوری، ماهی کپور نقره‌ای

\*نویسنده مسئول

## مقدمه

ماهی کپور نقره‌ای *Hypophthalmichthys molitrix* یا فیتوفاگ به دلیل سازش پذیری با محیط محصور، سرعت رشد بالا و داشتن زنجیره غذایی کوتاه، در آبی‌پروری از ارزش بالایی برخوردار است (جلیلی، ۱۳۸۸). ارزیابی و مقایسه قیمت تمام شده محصولات تهیه شده از ماهیان گرمابی نیز نشان داده که استفاده از ماهی فیتوفاگ مقرون به صرفه‌تر می‌باشد (ذوالفقاری و همکاران، ۱۳۸۹). از آنجائیکه تولید این ماهی در رقابت با ماهیان خوش خوراک تر، ماهی کم مصرفی محسوب می‌گردد؛ بنابراین تولید فرآورده‌های متنوع از این ماهی برای ترویج مصرف آن ضروری به نظر می‌رسد (اصغرزاده کانی و همکاران، ۱۳۸۵).

بطور کلی از نکات بسیار مهم در فرآوری و عرضه ماهی‌ها، نگهداری آنها برای مدت طولانی با کمترین تغییرات در ترکیب شیمیایی و جلوگیری از فساد آنها می‌باشد. یکی از مهمترین ترکیبات شیمیایی موجود در بدن ماهی با ارزش غذایی بالا، اسیدهای چرب غیراشباع هستند. این اسیدهای چرب در مجاورت هوا اکسید شده نه تنها خواص خود را از دست می‌دهند، بلکه با تغییرات نامطلوبی که به ویژه در طعم و بوی محصولات ایجاد می‌کنند، با ظهور علائم فساد محصول را غیر قابل مصرف می‌نمایند. با توجه به اینکه بسیاری از ماهیان دارای مقادیر زیادی از اسیدهای چرب چند غیراشباعی هستند، بنابراین تندی اکسیداتیو مهم‌ترین مشکل تکنولوژی فرآوری غذاهای دریایی است (فهمیم‌دژبان، ۱۳۸۷).

مطالعه روی استفاده از منابع طبیعی و بویژه آنتی‌اکسیدانهای گیاهی که اثرات مفید، همچون تاثیرات ضد سرطانی بر سلامت افراد دارند، محرز گردیده است (Peralta et al., 2005).

یکی از این راهکارها، استفاده از عصاره گیاهان دارویی در محصولات شیلاتی بخصوص گوشت ماهی می‌باشد که با توجه به اینکه منابع ارزشمندی از آنتی‌اکسیدانهای طبیعی هستند، می‌توان با استفاده از آنها در ترکیب با گوشت بدون استخوان ماهی، ضمن افزایش عمرماندگاری آن، در بهینه‌سازی خواص حسی از طریق کاهش اکسیداسیون چربی‌ها نیز اقدام نمود. از انواع این ترکیبات می‌توان به عصاره آویشن *Rosmarinus officinalis* و رزماری *Zataria multiflora* اشاره نمود (اسماعیل‌زاده کناری، ۱۳۹۰).

هدف از این تحقیق بررسی پتانسیل آنتی‌اکسیدان عصاره رزماری و آویشن شیرازی بر میزان پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور نقره‌ای می‌باشد.

## مواد و روش کار

تمامی مراحل انجام تحقیق در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان واقع در بندرانزلی (وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) در سال ۹۱-۱۳۹۰ صورت گرفت. پس از خریداری و تهیه ماهی کپور نقره‌ای (۷۰۰-۵۰۰ گرمی) با نسبت یک به یک یخ‌گذاری شده و سپس توسط ماشین یخچال دار به محل مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان حمل و پس از توزین تا شروع عملیات عمل‌آوری، در دمای پائین (کمتر از ۴ درجه سانتیگراد) نگهداری گردید، در این مرحله بعد از سرزنی و تخلیه شکمی، ماهیان فیله شده با آب تمیز شستشو داده می‌شوند. پس از شستشوی کامل، فیله‌ها در داخل دستگاه استخوان‌گیر (Deboner) قرار داده می‌شوند و جداسازی گوشت ماهی از استخوان انجام می‌گیرد (اصغرزاده کانی و همکاران، ۱۳۸۵). در نهایت، آماده‌سازی تیمارها پس از تهیه عصاره الکلی مورد نیاز از آویشن و رزماری (Arashisar et al., 2008) براساس افزودن غلظت‌های منتخب عصاره آویشن و رزماری به گوشت چرخ شده بدون استخوان ماهی انجام گرفت. بدین منظور نمونه‌ها را میکس نموده، داخل لفاف پلی‌اتیلنی بسته‌بندی کرده، بر روی هر بسته مشخصات آن شامل تاریخ تولید و مشخصات تیمار ثبت گردید.

تیمار ۱ - شاهد : گوشت چرخ کرده منجمد در بسته بندی معمولی (normal packing)

تیمار ۲: گوشت چرخ کرده منجمد + آویشن ۳۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم

تیمار ۳: گوشت چرخ کرده منجمد + رزماری ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم

تیمار ۴: گوشت چرخ کرده منجمد + ترکیب رزماری (۱۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) و آویشن (۱۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم)

بعد از انجماد سریع نمونه‌ها در اسپیرال فریزر (با روش انجماد سریع انفرادی (IQF: Individual Quick Freezing) طی ۱۵ دقیقه در دمای ۴۰- درجه سانتیگراد)، جهت نگهداری به

## نتایج

در این تحقیق سطوح مختلف اسیدهای چرب اعم از اشباع و غیراشباع در ۳ تیمار آزمایشی و ۱ تیمار شاهد بشرح ذیل شناسایی گردیده است:

الف : اسیدهای چرب اشباع: مرستیک، پالمتیک، هیتادکانوئیک، استئاریک، آراشیدیک،

ب : اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA): پالمیتولئیک، اولئیک ۱، گادولئیک، ایکوزانوئیک

ج . اسیدهای چرب چند غیراشباع (PUFA): لینولئیک ۲، آلفالینولئیک

د . اسیدهای چرب چند غیراشباع بلند زنجیره (HUFA): آراشیدونیک، ایکوزاپنتانوئیک اسید دوکوزاهگزانوئیک اسید

نتایج ترکیب شیمیایی و پروفایل اسید چرب (نمودارهای ۱ تا ۵) در این تحقیق نشان داد میزان اسیدهای چرب در تیمارهای مختلف، از نسبت MUFA>SFA>PUFA>HUFA تبعیت کرده بطوریکه میانگین هر کدام از گروه اسیدهای چرب در تیمار شاهد، تیمار آویشن، تیمار رزماری و تیمار ترکیبی در بسته بندی معمولی، نشان دهنده غنی بودن از نظر اسیدهای چرب تک غیراشباع بوده است.

نتایج این تحقیق نشان داد فراوانترین اسید چرب در گروه اسیدهای چرب اشباع SFA، پالمتیک، در گروه اسیدهای چرب تک غیر اشباع MUFA، اولئیک در گروه اسیدهای چرب چند غیراشباع PUFA، اسید چرب لینولئیک و در گروه اسیدهای چرب چند غیراشباع PUFA، اسید چرب لینولئیک و در گروه اسیدهای چرب چند غیراشباع بلند زنجیره HUFA، دوکوزاهگزانوئیک اسید می باشند.


سردخانه با دمای (۱۸-) درجه سانتی گراد انتقال یافتند. مدت زمان نگهداری در سردخانه، و اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب تا پایان عمر ماندگاری محصول انجام گرفت که براساس جدول زمانی از پیش تعیین شده نمونه برداری جهت تعیین و اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب، از فاز صفر آغاز سپس در ماه اول در فواصل ده روزه، در ماه دوم ۱۵ روزه و از ماه سوم به بعد بصورت ماهانه صورت گرفت. شناسائی، تعیین و اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی (GC:Gas Chromatography) در آزمایشگاه تحقیقاتی واستریوش واقع در ساری انجام گردید (Farhoosh et al., 2009).

با توجه به توزیع داده ها و به منظور مقایسه آنها با یکدیگر تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصله با نرم افزار SPSS17 انجام پذیرفت. پس از توزیع نرمال داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف - اسمیرنوف، نتایج این آزمون ها جهت آنالیز آماری داده های مربوط به تیمارهای آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی تاثیر زمان ماندگاری در میزان پایداری آنتی اکسیدان (رزماری، آویشن و ترکیب و مقایسه آن با تیمار شاهد) و همچنین میزان تغییرات اسیدهای چرب در تیمارهای مورد نظر و بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد بین مقادیر حاصل از هر شاخص در زمانهای به فاصله ۱۰ روز و نهایتا تا ۶ ماه نگهداری از روش تجزیه واریانس یک طرفه و دو طرفه همچنین برای مقایسه میانگین ها در مواردی که اثر کلی تیمارها معنی دار شناخته شد از آزمون دانکن DUNCAN استفاده گردید.


جدول ۱: میانگین میزان اسیدهای چرب شناسائی شده در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ (گرم در ۱۰۰ گرم نمونه)

اسید چرب	فرمول شیمیائی	میانگین ترکیب	میانگین رزماری	میانگین آویشن	میانگین شاهد
<b>SFA: Saturated Fatty Acid</b> اسیدچرب اشباع					
مریستیک	C14 : 0	۳۰/۸۵±۰/۹۵	3/91 ±0/99	4/07 ±0/64	3/94 ±0/44
پالمیتولئیک	C 16 : 0	21/7 ±1/14	22/02 ±1/47	20/54 ±1/40	20/9 ±0/99
هپتادکانوئیک	C 17 : 0	1/47 ±0/82	1/7 ±0/70	1/43 ±0/74	1/48 ±0/44
استئاریک	C 18 : 0	6/18 ±1/83	5/36 ±0/84	4/73 ±0/94	5/2 ±0/34
آراشیدیک	C 20 : 0	0/38 ±0/08	0/41 ±0/14	0/35 ±0/06	0/26 ±0/05
<b>MUFA: Mono Unsaturated Fatty Acid</b> اسیدچرب تک غیراشباع					
پالمیتولئیک	C16 : 1-W <sub>7</sub>	10/87 ±0/62	10/42 ±0/78	10/45 ±1/15	9/75 ±0/91
اولئیک	C18 : 1-W <sub>9</sub>	28/86 ±2/19	28/18 ±1/03	27/57 ±1/09	25/64 ±1/37
ایکوزانوئیک	C 20 : 1 - W <sub>9</sub>	1/47 ±0/48	1/19 ±0/20	1/42 ±0/28	1/43 ±0/29
<b>PUFA: Poly Unsaturated Fatty Acid</b> اسیدچرب چند غیراشباع					
لینولئیک	C 18 : 2- W <sub>6</sub>	3/54 ±0/80	4/25 ±0/65	4/07 ±0/98	5/37 ±0/60
آلفالینولئیک	C 18 : 3 - W <sub>3</sub>	3/77 ±0/77	4/11 ±1/24	5/63 ±1/09	5/82 ±0/77
<b>HUFA: High Unsaturated Fatty Acid</b> اسیدچرب چند غیراشباع بلندزنجیره					
آراشیدونیک	C 20 : 4 -W <sub>6</sub>	۰/۵۵ ±۰/۱۰	0/53 ±0/16	0/71 ±0/17	0/87 ±0/45
ایکوزاپنتانوئیک	C 20 : 5EPA/W <sub>3</sub>	2/19 ±0/59	2 ±0/79	2/48 ±0/59	3/25 ±1/94
دوکوزاهگزانوئیک	C 22 : 6DHA/W <sub>3</sub>	2/94 ±1/24	2/46 ±1/02	4/18 ±1/37	5/26 ±2/13


[ DOI: 10.22092/ISFJ.2017.110122 ] Downloaded from isfj.ir at 20:19 +0330 on Tuesday November 20th 2018




نمودار ۱: میزان اسیدهای چرب اشباع شناسائی شده در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ




نمودار ۲: میزان اسیدهای چرب تک غیر اشباع شناسائی شده در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ




نمودار ۳: میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع شناسائی شده در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ



نمودار ۴: میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع بلند زنجیره شناسائی شده در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ




نمودار ۵: پروفایل اسیدهای چرب شناسایی شده در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ




نمودار ۶: میزان تغییرات اسیدچرب پالمیتولیک در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ

نسبت به زمان صفر کاهش و با کمترین تغییرات در مقابل عوامل محیطی روبرو بوده ولی تغییرات در کلیه تیمارها از نوسانات یکسانی در طول زمان برخوردار نبوده است و روند افزایش و کاهش در طول زمان بصورت خطی نبوده (نمودار ۷) همچنین مقایسه میانگین ها در کلیه تیمارها فقط با در نظر گرفتن زمان معنی دار بوده است  $P < 0.05$  و اسید چرب پالمیتولیک که اسیدچرب اشباع غالب را در روغن ماهی شامل می شود بین ۲۰/۵ تا ۲۲/۰۲ درصد متغیر بوده که بیشترین میزان مربوط به تیمار حاوی رزماری می باشد.

بنابراین در این بررسی مشخص گردید با توجه به میانگین مقادیر بدست آمده در طول زمان و با تاثیرگذاری آنتی اکسیدانهای طبیعی و مقایسه آن با تیمار شاهد، با توجه به نمودار (۶) اسید چرب پالمیتیک C 16 : 0 پایداری خوبی در طول زمان داشته و با بررسی میانگین ها تحلیل دقیق از میزان اکسیداسیون در ۴ تیمار برای برتری هر کدام نسبت به همدیگر وجود ندارد چون شیب تغییرات بسیار ملایم بوده و همچنین مقایسه میانگین ها فقط با در نظر گرفتن زمان معنی دار بوده است  $P < 0.05$ ؛ اسید چرب اولئیک C18 : 1 در تیمار ۳ تنها آنتی اکسیدان رزماری فقط ۰/۰۴ بر حسب گرم در ۱۰۰ گرم




نمودار ۷: میزان تغییرات اسیدچرب اولئیک در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ



نمودار ۸: میزان تغییرات اسیدچرب لینولئیک در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ

18:2 (نمودار ۸) در تیمار ۴ با مخلوط آنتی اکسیدان رزماری و آویشن با میانگین  $3/54 \pm 0/80$  کمترین تغییرات در مقابل عوامل محیطی روبرو بوده ولی تغییرات در کلیه تیمار از نوسانات یکسانی در طول زمان برخوردار نبوده است و روند افزایش و کاهش در طول زمان بصورت خطی نبوده همچنین مقایسه میانگین ها در کلیه تیمارها فقط با در نظر گرفتن زمان معنی دار بوده است  $P < 0.05$

میزان اسید لینولئیک موجود در نمونه شاهد و سه تیمار آزمایشی از  $5/37$  تا  $3/54$  درصد متغیر بوده که به ترتیب بیشترین میزان مربوط به نمونه شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار ترکیبی می باشد، به عبارتی بیشترین سرعت کاهش (تخریب) در تیمار ترکیبی اتفاق افتاده است. این در حالیست که تیمار حاوی رزماری پس از نمونه شاهد در رتبه دوم قرار گرفته که نشان دهنده توانایی عصاره رزماری در پایداری اسیدهای چرب نسبت به سایر تیمارها می باشد. اسید چرب لینولئیک C



نمودار ۹: میزان تغییرات اسیدچرب دوکوزاهگزانوئیک در گوشت چرخ شده منجمد ماهی فیتوفاگ

نگهداری بر روی اسیدهای چرب به حداقل رسیده است. همچنین بررسی آزمون‌های آماری نشان می‌دهد؛ تیمار ۳ یعنی گوشت چرخ شده منجمد فیتوفاگ حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم رزماری در کیلوگرم گوشت، از لحاظ میزان اسیدهای چرب پایداری بیشتری را طی دوره نگهداری در سردخانه (18-) درجه سانتی‌گراد در مقایسه با نمونه شاهد و سایر تیمارها نشان داده است.

## بحث

در این تحقیق میزان اسیدهای چرب در تیمارهای مختلف، از نسبت MUFA>SFA>PUFA>HUFA تبعیت کرده که نشان دهنده غنی بودن کلیه تیمارها از نظر اسیدهای چرب تک غیراشباع بوده است، ضمن اینکه تیمار حاوی رزماری نیز از همین نسبت در مقایسه با سایر تیمارها، تبعیت می‌کند.

در رابطه با مجموع اسیدهای چرب اشباع ( $\Sigma$ SFA) با توجه به نتایج میتوان تغییرات ناپایداری را پیش بینی کرد، البته با توجه به اشباع بودن این گروه از اسیدهای چرب و مقاومت آنها در برابر عوامل محیطی مانند اکسیداسیون باید گفت روند تغییر معنی دار بوده است. در تجزیه تحلیل این تغییرات میتوان نتیجه گرفت که هر چقدر به طرف زنجیره بلند حرکت میکنیم حتی در اسیدهای چرب غیراشباع ناپایداری بیشتر بوده و زمان انجماد تاثیر بیشتری در کیفیت گوشت چرخ شده دارد. در ارتباط با مجموع اسیدهای چرب تک غیراشباع ( $\Sigma$ MUFA) با توجه به

در اسید چرب دوکوزاهگزانوئیک اسید C 22 : 6 (نمودار ۹) در بین تیمارهای بکارگیری شده از آنتی‌اکسیدانهای طبیعی، تیمار ۳ و با بکارگیری آنتی‌اکسیدان رزماری با میانگین  $\pm 1/02$  ۲/۴۶ بهترین پایداری را داشته ضمن این که در بین ۴ تیمار و در مقایسه با تیمار شاهد که بیشترین ناپایداری را داشته نیز تیمار ۳ با کمترین تغییرات اکسیداسیون روبرو بوده همچنین مقایسه میانگین‌ها در کلیه تیمارها فقط با در نظر گرفتن زمان معنی‌دار بوده است  $P < 0/05$

میزان اسید لینولئیک در چهار تیمار تفاوت معنی‌داری نداشته و طی مدت زمان نگهداری، میزان آن در هر چهار تیمار کاهش یافته که بیشترین سرعت تخریب مربوط به تیمار ترکیبی و کمترین سرعت تخریب مربوط به نمونه شاهد می‌باشد. هرچه غیراشباعیت روغن‌ها بیشتر باشد حساسیت آنها نسبت به تخریب اکسیداتیو بیشتر می‌شود.

بنابراین براساس نتایج حاصله از پروفایل اسیدهای چرب و شاخص‌های مربوط به آنها مشخص گردید نگهداری گوشت چرخ شده حاوی عصاره‌های آویشن و رزماری در شرایط انجماد، باعث پایداری اسیدهای چرب در گونه‌های مختلف اسیدهای چرب تک غیراشباع، اسیدهای چرب چند غیراشباع، اسیدهای چرب غیراشباع (بلند زنجیره) حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ و اسیدهای چرب امگا ۶ گردیده بطوریکه در هیچ کدام از اسیدهای چرب اندازه‌گیری شده، روند کاهشی و یا افزایشی معنی‌داری مشاهده نگردید، ضمن اینکه تغییرات اکسیداسیون در طول زمان

آنچوی بلافاصله پس از صید و طی نگهداری به صورت منجمد در دو برودت ۱۸- و ۳۰- درجه سانتی گراد طی ۸ ماه بررسی، نتایج آماری نشان داد نمونه‌های ماهی نگهداری شده در هر دو دما، از نظر ترکیب اسیدهای چرب چند غیراشباعی (PUFA) و امگا ۳ کاهش معنی‌داری در دوره نگهداری دارد ( $P < 0.05$ ). که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

Osibona و همکاران (۲۰۰۹)، اسیدهای چرب تیلایپا زیلی (*Tilapia zillii*) را مورد بررسی قرار دادند. بیشترین اسید چرب، اسید اولئیک (C18:1) به میزان ۲۶/۰ درصد به دست آمد. بالاترین میزان امگا ۳، مربوط به کلوپانودونیک اسید (C22:5) به مقدار ۳/۷ درصد بود. نسبت امگا ۳ به امگا ۶ هم ۲/۷ محاسبه شد. نتایج حاصل دلالت بر صحت نتایج این تحقیق دارد.

اعتمادی و همکاران در سال ۲۰۰۳ اثر آنتی اکسیدانی عصاره رزماری (۱/۱ درصد) در ماهی قزل آلی رنگین کمان بسته بندی شده در خلاء را بررسی کردند. نتایج نشان داد عصاره رزماری به طور معنی‌داری اکسیداسیون لیپیدها را در ماهیان تیمار شده به تعویق انداخت. طبق بررسی‌ها حسی و میکروبی، ماهی قزل آلی رنگین کمان تیمار شده با عصاره رزماری تا انتهای دوره نگهداری قابل مصرف بودند به طوری که عصاره رزماری توانست عمر ماندگاری نمونه را نسبت به نمونه شاهد ۴ روز افزایش دهد.

## تشکر و قدردانی

این پروژه با حمایت مالی و علمی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان وابسته به مؤسسه تحقیقات شیلات ایران انجام گردیده‌است.

بر خود لازم می‌دانیم از تلاش و همکاری صمیمانه مهندس فرحناز لکزائی، مهندس محمود وطن دوست و مهندس افشین فهیم و کلیه کارکنان بخش تولید و آزمایشگاه‌های مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان (بندر انزلی) و همچنین از ریاست محترم آزمایشگاه تحقیقاتی واسترپوش، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده کناری و مسئول محترم آزمایشگاه، جناب آقای

نتایج بدست آمده برای این گروه از اسیدهای چرب، روند ثابتی مشاهده نگردید. از مجموع اسیدهای چرب چند غیراشباع ( $\Sigma$ PUFA) نمی‌توان پیش بینی دقیقی از وضعیت این گروه از اسیدهای چرب در طول زمان داشت، البته در تحلیل این موضوع باید حساسیت اسیدهای چرب چند غیر اشباع در برابر عوامل محیطی را ذکر کرد. Pirestani و همکاران (۲۰۱۰)، تغییرات اسیدهای چرب چند گونه ماهی دریای خزر شامل ماهی سفید (*Rutilus frisii kutum*)، کفال طلائی (*Liza aurata*)، کپور معمولی (*Cyprinus carpio*)، سوف (*Sander lucioperca*) و کیلکای معمولی (*Clupeonella cultiventris caspia*) را بررسی نمودند و مشاهده کردند در زمان نگهداری در سردخانه تغییراتی در مقادیر اسیدهای چرب به وجود آمد. در نمونه‌ها میزان PUFA کاهش معنی‌داری از خود نشان داده است و درصد SFA هم افزایش یافته است (۰/۰۵  $P <$  ۲۳ درصد به ۱۵ درصد رسید. همچنین بیشترین افزایش SFA هم در همین گونه مشاهده شد که از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد در پایان زمان نگهداری در سردخانه رسید؛ نتایج حاصل دلالت بر صحت نتایج این تحقیق دارد.

مجموع اسیدهای چرب امگا ۳ در این تحقیق روند ثابتی نداشتند و معمولاً کاهش داشته که علت آن از طرفی حساسیت زیاد این گروه از اسیدهای چرب در برابر ناپایداری‌های محیطی بوده است. از مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۶ در هیچ کدام از تیمارها روند ثابتی به صورت افزایش یا کاهش مشاهده نشد ولی معمولاً اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۶ تحت تاثیر زیاد عوامل محیطی و مخصوصاً در دمای انجماد روند کاهشی داشت، در تحقیقات انجام گرفته توسط Nazemroaya در سال ۲۰۰۹، تحت عنوان اثر انجماد طی ۶ ماه بر اسیدهای چرب در دو گونه *Carcharhinus* و *Scomberomorus*، گزارش شده که روند تغییرات در اسیدهای چرب طی ۶ ماه نگهداری در دمای (۱۸-) درجه سانتیگراد، افزایشی بوده و نشان از اکسیداسیون در طول زمان بوده است. در تحقیقی دیگر که توسط Rezaei و همکاران در سال ۲۰۰۲ انجام شد در کیلکای

- Arashisar, S. Hisar, O. Kaban, G. and Kaya, M., 2008.** The Effects of Nettle on Chemical Properties of Rainbow Trout Fillets. American Journal of Food Technology, 3(5):335-340. Academic Journal Inc.
- Farhoosh, R., Esmailzadeh Kenari, R., Poorazrang, H., 2009.** Frying Stability of Canola Oil Blended with Palm Olein, Olive, and Corn Oils. Journal of American Oil Chemistry Society, 86, pp.71-76.
- Nazemroaya, S., Sahari, M.A. and Rezaei, M., 2009.** Effect of frozen storage on fatty acid composition and changes in lipid content of *Scomberomorus commersoni* and *Carcharhinus dussumieri*. Journal of Applied Ichthyology, 25: 91-95.
- Osibona, A.O. Kusemiju, K. and Akande, G.R., 2009.** Fatty acid composition and amino acid profile of two freshwater species, African catfish (*Clarias gariepinus*) and tilapia (*Tilapia zillii*). African Journal of Agriculture, 9:608-621.
- Peralta, E., Hatate, H., Watanabe, D., Kawabe, D., Murata, H., Hama, Y., 2005.** Antioxidative activity of Philippine salt-fermented shrimp paste and variation of its contents during fermentation. Journal of Oleo Science, 54: pp.553-558.
- Pirestani, S., Sahari, M.A. and Barzegar, M., 2010.** Fatty acids changes during frozen storage in several fish species from south Caspian Sea. Journal of Agriculture of Technology, 12:321-329.

مهندس رودگر در مراحل مختلف انجام این تحقیق تشکر و قدردانی بعمل آید.

## منابع

- اسماعیل زاده کناری، ر.، ۱۳۹۰. بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره برخی از گیاهان. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه. مازندران.
- اصغرزاده کانی، ا؛ شعبانپور، ب؛ حسینی، ه. و سبزواری، ا؛ ۱۳۸۵. اثر مدت زمان نگهداری بصورت منجمد بر روند تغییر کیفیت گوشت چرخ شده حاوی محافظ سرمایی ماهی فیتوفاگ. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، گرگان. ۷۰ صفحه.
- اعتمادی، ح.، رضائی، م.، عابدیان، ا.، ۱۳۸۲. پتانسیل آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره رزماری در افزایش عمر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان اولین همایش ملی علوم آبزیان، ۴ الی ۱۰ اسفند ۱۳۸۲، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، صفحات ۶۷ تا ۷۶.
- جلیلی، س.ح.، ۱۳۸۸. استفاده از قسمت های خاص ماهی کپور نقره ای برای تولید فیله. گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان شیلات ایران شماره ثبت ۸۸/۷۶۶، ص. ۶۸ صفحه.
- ذوالفقاری، م.؛ شعبانپور، ب.؛ فلاح زاده، س. ۱۳۸۹. مقایسه تأثیر آویشن شیرازی، پیاز و کاکوتی کوهی بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان؛ نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی؛ جلد ۶؛ شماره ۳ صفحات ۱۷۵-۱۶۸.
- فهم دژبان، ی.، ۱۳۸۷. فرآوری محصولات شیلاتی. انتشارات مهرالنبی. ۲۹۱ صفحه.
- نعمتی، م.؛ شعبانپور، ب.؛ شعبانی، ع. و قلی‌زاده، م.، ۱۳۸۸. مطالعه تغییرات کیفیت چربی و خصوصیات حسی برگرهای تولید شده از مخلوط سوریمی ماهی کپور معمولی *Cyprinus carpio* و گوشت قرمزی نگهداری در یخچال. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ۱۶(۱) - الف). صفحات ۱۱۷ تا ۱۰۸.

**Rezaei, M., Sahari, M.A., Moini, S., Safari, M.,  
Rezaiean, M. and Ghafari, F., 2002.**  
Some qualitative characteristics of lipid in

anchovy kilka, (*Clupeonella engrauliformis*),  
during frozen storage. Iranian J. of Marine  
Sciences, 1: pp.55-65.

## Study on effect of *Rosmarinus officinalis* and *Zataria multiflora* extracts on the stability of fatty acids in frozen silver carp minced

Fahimdezhban, Y. <sup>(1)\*</sup>; Motallebi, A.A. <sup>(2)</sup>; Hosseini, E. <sup>(3)</sup>; Khanipour, A.A. <sup>(4)</sup>; Soltani, M. <sup>(5)</sup>; Zaregashti, G. <sup>(6)</sup> and Khodabandeh, F. <sup>(7)</sup>

Dr.Fahim79@yahoo.com

1,3-Science and Research Branch Islamic Azad University, P.O.Box:14515-775 Tehran, Iran

2-Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box:116-13185 Tehran, Iran

4,6,7-Aquatic Fish Processing Research Center, P.O.Box:43145-1655 Bandar Anzali, Iran

5-Faculty of Veterinary, Tehran University, P.O.Box: 14155-6433 Tehran, Iran

Received: January 2013

Accepted: May 2013

**Keywords:** Antioxidants, Medicine plant, Processing, silver carp

### Abstract

In this study, the effect of Rosemary and Zataria extracts on three different treatments in frozen Silver carp minced were studied in normal packaging. Therefore, a control and three treatments were defined:

Treatment 1 - Control: frozen meat packaged in conventional

Treatment 2: Frozen Silver carp minced + Zataria 300mg/kg in normal packaging

Treatment 3: Frozen Silver carp minced + Rosemary 200mg/kg in normal packaging

Treatment 4: Frozen Silver carp minced + Rosemary compound (100mg/kg) and Zataria (100mg/kg) in normal packaging

After quick freezing of samples in the spiral freezer by individual quick freezing method, to maintain the cold temperature (-18)°C were transferred. For six month, Sampling and measurements to determine the fatty acid profile of the zero phase beginning in the first month and then every ten days, and 15 days in the second month of the third month after the monthly test. Identifying, defining and measuring the fatty acid profile by gas chromatography was performed. In this study, levels of both saturated and unsaturated fatty acids in three experimental and one control were identified as follows:

A: SFA: (Saturated Fatty Acid): Meristic C14: 0/ Palmitic C16: 0 /Hepta decaenoic C17: 0 / Stearic C18: 0 / Arashidic C20: 0

B: (MUFA Mono Unsaturated Fatty Acid): Palmitoleic C16: 1-W7 / Oleic C18: 1-W9 /Gadoleic C20: 1 - W9

C: (PUFA Poly Unsaturated Fatty Acid): Linoleic C18: 2-W6 / $\alpha$ -Linolenic C18:3-W3

D: (HUFA High Unsaturated Fatty Acid): Arachidonic C20: 4 - W6 Eicosa panta enoic acid C20: 5-EPA/W3 Docosa hexa enoic acid C22: 6-DHA/W3. Results of this study was to determine keep frozen fish meat containing extracts of Zataria and Rosemary in freezing conditions, stability of different types of fatty acids, mono unsaturated fatty acids, poly unsaturated fatty acids, high unsaturated fatty acids, So that none of the fatty acids measured, were not observed increase or decrease Changes over time while maintaining the oxidation of fatty acids is minimized.

The results obtained from the profile of fatty acids and their related indices and statistical tests show the treatment contains Rosemary extract show greater stability than thyme during storage (-18)°C. According to studies, Frozen minced fish meat treated with extracts of Rosemary, was used until the end of the storage period.

\*Corresponding author