

بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (*Atherina boyeri caspia* Risso, 1810) در

سواحل جنوب شرقی دریای خزر

ابولقاسم امری صاحبی^(۱)، حسن تقوی^{(۱)*}، حسن فضل^(۲)

* taghavi25@yahoo.com

۱- گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران

۲- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تاریخ دریافت: آبان ۱۳۹۳

تاریخ پذیرش: بهمن ۱۳۹۳

چکیده

شیشه ماهی یکی از ماهیان با ارزش اکولوژیکی بالاست، که به مصرف تغذیه ماهیانی همچون تاسماهیان در دریای خزر می رسد. در این تحقیق ۱۹۱ نمونه ماهی از سواحل جنوب شرقی دریای خزر از آذر ماه ۱۳۹۲ تا شهریور ماه ۱۳۹۳ و بطور فصلی صید و بررسی شد. در مطالعه حاضر تعیین اقلام غذایی و شاخص های طول نسبی لوله گوارش (RLG)، شاخص تهی بودن لوله گوارشی (VI) و شدت تغذیه (IF) مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان بررسی شده دارای میانگین طول چنگالی ($\pm$ انحراف معیار) $1/09 \pm$ و $7/7$ سانتیمتر، میانگین وزن ($\pm$ انحراف معیار) $3/64 \pm 1/49$ گرم و میانگین سن ($\pm$ انحراف معیار) $2 \pm 0/81$ سال بودند. این ماهیان با میانگین طول نسبی لوله گوارش ($\pm$ انحراف معیار) $0/46 \pm 0/07$ جزء ماهیان گوشتخوار محسوب می شوند. میانگین شاخص تهی بودن لوله گوارشی ۴۵ درصد محاسبه گردید که نشان دهنده نسبتاً پرخوری این ماهیان می باشد. میانگین شدت تغذیه ($\pm$ انحراف معیار) آنها $535 \pm 221/21$ است که حد متوسط برای این ماهی در این منطقه می باشد. براساس اولویت غذایی تعیین شده نیز گاماروس (بنتوز) و دافنی (زئوپلانکتون) بالاترین فراوانی حضور غذا را در بین سایر طعمه های خورده شده داشتند. نتایج این تحقیق فعالیت شکاری فرصت طلبانه این ماهی برای کسب غذا را نشان می دهد.

لغات کلیدی: شیشه ماهی، ساحل جنوب شرقی دریای خزر، رژیم غذایی، شدت تغذیه

*نویسنده مسئول

مقدمه

شیشه ماهی (*Atherina boyeri caspia* (Risso 1810)، یک ماهی کوچک، کوتاه عمر و دارای تحمل دامنه شوری بالا است که معمولاً در آبهای داخلی آفریقا، آسیا، اروپا، شمال و شرق اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، سیاه و دریای خزر پراکنش دارد (Fishbase, 2014). مطالعات متعددی در مورد عادات تغذیه ای *A. boyeri* در محیط های دریایی و لب شور انجام شده است (Danilova, 1991؛ Trabelsi et al., 1994؛ Gisbert et al., 1996؛ Bartulovic et al., 2004؛ Vizzini and Mazzola, 2005). این ماهی بطور عمده از پلانکتون و یا بی مهرگان اعماق دریا (بیشتر سخت پوستان) بسته به فراوانی آنها تغذیه می کند و آن را بعنوان یک مشخصه عمومی و شکارچی فرصت طلب می توان در نظر گرفت (Bartulovic et al., 2004). این ماهی را غالباً گوشتخوار می نامند زیرا از موجوداتی شامل: سخت پوستان پلانکتونی نظیر پاروپایان، ناجورپایان، صدفیان، لارو سنجاقک ها، سوسک ها، نرئیس، شیرونومیده، حشراتی نظیر دیپترا، کرمهای پرتار و کرمهای حلقوی، و سایر نرم تنان و بی مهرگان و نیز لارو ماهیان تغذیه می کند (Fishbase, 2014). این ماهی مورد تغذیه و شکار بسیاری ماهیان از جمله ماهیان خاویاری و نیز جنس های *Trachurus*, *Alosa*, *Dicentrarchus*, *Sander*, *Silurus*, *Uranoscopus* گاوماهیان و نیز فک دریای خزر قرار می گیرد (Markevich, 1977). این ماهی در دریای خزر بطور اقتصادی صید نشده بلکه به همراه ماهی کیلکا بطور ضمنی صید می گردد (Markevich, 1977). در دریای خزر و سایر نقاط جهان، به دلیل عدم صید و مصرف، تولید مثل در قسمتهای پائینی رودخانه و همچنین پراکنش سریع، ذخایر این ماهی در وضعیت LC (کمترین نگرانی) قرار دارد (IUCN, 2014). در مطالعه حاضر به بررسی غذا وعادات غذایی شیشه ماهی در جنوب شرقی دریای خزر (واقع در نیروگاه نکا) پرداخته شد. از لحاظ مدیریت اکوسیستم، چنین مطالعاتی برای بررسی نقش زیست محیطی گونه و درک موقعیت آن در ساختار شبکه غذایی دریاچه ضروری هستند. اهداف خاص این بررسی شامل: (۱) اولویت رژیم غذایی شیشه ماهی نسبت به ماه، سن و در دسترس بودن طعمه (۲) وجود شکار انتخابی توسط این ماهی و (۳) انتخاب طعمه، بر اساس فراوانی ماهی می باشد.

مواد و روش کار

در این مطالعه تمام نمونه ها در پنج مرحله، طی ماههای آذر، دی و اسفند ۱۳۹۲ و نیز اردیبهشت و شهریور ۱۳۹۳ توسط تور پره ریز چشمه (با چشمه ۸ میلیمتر) به طول ۱۰۰ متر و ارتفاع ۶ متر از منطقه نیروگاه نکا واقع در جنوب شرقی دریای خزر به تعداد ۱۹۱ قطعه ماهی صید گردید و در ظرف حاوی فرمالین ۱۰ درصد به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها جهت بررسی محتویات معده و روده کالبد گشایی شدند. دستگاه گوارش نمونه ها از ابتدای مری تا انتهای روده بصورت یکپارچه جدا شدند و درون فرمالین ۱۰ درصد قرار گرفتند. پس از اندازه گیری طول چنگالی (سانتیمتر)، طول لوله گوارشی (سانتیمتر) توسط کولیس با دقت ۱ میلیمتر و توزین وزن کل (گرم)، وزن لوله گوارشی و محتویات آن (گرم) توسط ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۰۱ گرم، در نهایت محتویات لوله گوارشی مورد بررسی قرار گرفت (De Moraes et al., 2004). جهت شناسایی محتویات معده نیز از منبع پلانکتون شناسی استفاده شد (بیرشتین و همکاران، ۱۹۶۸).

۱- برای محاسبه طول نسبی لوله گوارش (RLG) از فرمول زیر استفاده شد. اگر $RLG < 1$ باشد، ماهی گوشتخوار و اگر $RLG > 1$ باشد، ماهی گیاهخوار و مقدار بینابین هم نشانگر همه چیز خواری ماهی است (Al Hussainy, 1949).
طول کل بدن (سانتیمتر) / طول لوله گوارش (سانتیمتر) = RLG
۲- جهت برآورد شدت تغذیه (IF) از فرمول زیر استفاده گردید که در آن W وزن محتویات دستگاه گوارش به گرم و W وزن ماهی به گرم است. در صورتیکه IF بین مقادیر ۴۰۰ تا ۹۰۰ قرار گیرد، نشانگر تغذیه خوب ماهیان خواهد بود (Shorygin, 1952).

$$IF = (w/W) \times 10000$$

۳- جهت تعیین درصد فراوانی حضور غذا (اولویت غذایی) (FP) از رابطه زیر استفاده گردید که در آن N_i تعداد معده های محتوی طعمه i ام و N_s تعداد معده های محتوی غذا است (Euzen, 1987).

$$FP = (N_i/N_s) \times 100$$

مقادیر حاصل از این فرمول بسته به تغییرات مقدار FP دارای مشخصه های زیر است: اگر $FP < 10$ باشد یعنی شکار خورده شده تصادفی بوده و اصلاً غذای آیزی محسوب نمی شود. اگر $10 < FP < 50$ باشد یعنی غذای خورده شده یک غذای

دسته دوم (فرعی) می باشد و این در صورتی است که شکار اصلی در دسترس نباشد. اگر $FP > 50$ یعنی غذای اصلی می باشد.

۴- برای تعیین شاخص تهی بودن معده (VI) نیز از رابطه زیر استفاده شد که در این رابطه E_s معادل تعداد معده های خالی و T_s معادل تعداد کل معده های بررسی شده است (Euzen, 1987).

$$VI = (E_s/T_s) \times 100$$

در این فرمول مقادیر ۰ تا ۱۰۰ به پنج دسته ۲۰ تایی تقسیم و بترتیب نشان پرخور، نسبتاً پرخور، متوسط خور، کم خور و نسبتاً کم خور بودن آیزی می باشد.

جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای Excel 2007 و SPSS 19 استفاده شد. برای مقایسه میانگین های طول و وزن بین جنسهای نر و ماده از آزمون t-test و برای مقایسه میانگین های طول، وزن، طول نسبی لوله گوارش و شدت تغذیه در سنین و ماههای مختلف نمونه برداری از آزمون ANOVA و توکی بکار برده شد.

نتایج

جدول ۱: میانگین ($\pm$ انحراف معیار) طول چنگالی (سانتیمتر)، وزن کل (گرم)، سن و فراوانی شیشه ماهی، برحسب ماههای نمونه برداری

(۱۳۹۲-۹۳)

ماه های نمونه برداری	طول چنگالی	وزن کل	فراوانی درصد	فراوانی تعداد
آذر (۱۳۹۲)	$b_{8/6} \pm 1/4$	$b_{4/32} \pm 1/92$	۱۰	۱۹
دی (۱۳۹۲)	$a_{7} \pm 1/2$	$a_{2/69} \pm 1/5$	۲۵/۶	۴۹
اسفند (۱۳۹۲)	$b_{7/8} \pm 0/6$	$b_{3/65} \pm 0/86$	۲۵/۶	۴۹
اردیبهشت (۱۳۹۳)	$b_{7/7} \pm 1/1$	$b_{3/88} \pm 1/46$	۲۶/۲	۵۰
شهریور (۱۳۹۳)	$b_{8/4} \pm 0/8$	$b_{4/52} \pm 1/18$	۱۲/۶	۲۴

حروف الفبای انگلیسی نتیجه معنی دار بودن ($p < 0.05$) مقایسه دو بدو آزمون توکی را خطا نشان می دهد.

جدول ۲: میانگین ($\pm$ انحراف معیار) طول چنگالی، وزن کل و سن شیشه ماهیان، برحسب گروههای سنی (۱۳۹۲-۹۳)

گروه های سنی	طول چنگالی	وزن کل	فراوانی درصد	فراوانی تعداد
۱	$a_{6/4} \pm 0/5$	$a_{2/0.5} \pm 0/61$	۲۵/۷	۴۹
۲	$b_{7/7} \pm 0/4$	$b_{3/62} \pm 0/58$	۵۵	۱۰۵
۳	$c_{8/8} \pm 0/5$	$c_{5/11} \pm 0/88$	۱۲/۶	۲۴
۴	$d_{10/1} \pm 0/8$	$d_{7/0.8} \pm 1/3$	۶/۸	۱۳

ادامه جدول ۲:

کل	۷/۷±۱/۱	۳/۶۴±۱/۴۹	۱۰۰	۱۹۱
----	---------	-----------	-----	-----

حروف الفبای انگلیسی نتیجه معنی دار بودن ($p < 0.05$) مقایسه دو بدو آزمون توکی را خطا نشان می دهد.


شاخص سیری (IF) براساس گروه سنی، تفاوت معنی داری (F=16.45, $p < 0.001$) داشتند، که این تفاوت در گروه سنی ۱ سال دیده شد (جدول ۳). همچنین میانگین این شاخص براساس ماههای نمونه برداری نیز، تفاوت معنی داری (F=17.68, $p < 0.001$) داشتند، که این تفاوت در اسفند ماه نسبت به سایر ماههای بررسی شده وجود دارد (شکل ۱).

در این تحقیق، شاخص RLG با دامنه ۰/۱۸ تا ۰/۶۳ و میانگین (± انحراف معیار) ۰/۴۶±۰/۰۷، نشان دهنده وضعیت گوشتخواری این ماهی در دریای خزر می باشد. میانگین طول نسبی لوله گوارشی (RLG)، براساس گروه سنی تفاوت معنی داری (F=5.85, $p < 0.001$) داشت، که این تفاوت در گروه سنی ۴ سال مشاهده شد (جدول ۳). میانگین شدت تغذیه یا

جدول ۳: میانگین (± انحراف معیار) طول نسبی لوله گوارشی (RLG) و شدت تغذیه (IF) برحسب گروههای سنی (۹۳-۱۳۹۲)

گروه های سنی	IF	RLG	فراوانی درصد	فراوانی تعداد
۱	a ۳۶۶/۸۰ ± ۱۸۰/۰۱	b ۰/۴۸ ± ۰/۰۴	۲۶/۷	۴۹
۲	b ۵۸۰/۹۰ ± ۲۰۱/۵۲	b ۰/۴۶ ± ۰/۰۷	۵۵/۳	۱۰۵
۳	b ۶۱۱/۹۰ ± ۲۰۸/۲۴	ab ۰/۴۴ ± ۰/۰۸	۱۲	۲۴
۴	b ۶۵۶/۵۰ ± ۲۱۹/۷۹	a ۰/۴۰ ± ۰/۰۵	۶	۱۳
کل	۵۳۵/۰۰ ± ۰/۰۶	۰/۴۶ ± ۰/۰۷	۱۰۰	۱۹۱

حروف الفبای انگلیسی نتیجه معنی دار بودن ($p < 0.05$) مقایسه دو بدو آزمون توکی را خطا نشان می دهد.



شکل ۱: تغییرات شدت تغذیه (IF) براساس ماههای نمونه برداری در شیشه ماهی (۹۳-۱۳۹۲)

رده Amphipod از خانواده Gammaridae و رده Ostracoda از خانواده Xestoleberididae و از زئو پلانکتون ها، رده Cladocera از خانواده های


اطلاعات حاصله از این بررسی نشان داد که شیشه ماهی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر از تنوع غذایی نسبتاً بالایی برخوردار می باشد (جدول ۴). این ماهی از بنتوزها،

شیشه ماهی منطقه نیروگاه نکا واقع در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر، هیچ نوع غذایی را بعنوان طعمه اصلی صید نکرد و این دو نوع از اقلام غذایی براساس فرمول FP بعنوان غذای فرعی یا جانبی بحساب می آیند (جدول ۴). تفکیک کلی اقلام غذایی براساس رده جانوری نیز نشان از اصلی نبودن اقلام غذایی براساس فرمول FP دارد (شکل ۲). همچنین بررسی انجام شده نشان داد که بنتوزها (Xestoleberididae, Gammaridae) ۴۵/۲ درصد، زئوپلانکتون ها (Daphnnidae, Polyphemidae, Holopediidae, Leptodoridae, Diaptomidae, Bosminidae, Cyclopoidae) ۴۳/۵ درصد تعداد طعمه های این گونه را تشکیل دادند، که بر اساس فرمول FP این ماهی غذای اصلی ندارد.

Daphnnidae, Bosminidae, Leptodoridae, Copepoda و Holopediidae و Polyphemidae از خانواده های Diaptomidae و Cyclopoidae و از رده Nematoda که انگل معده است و حشرات رده Diptera از خانواده های Tipulidae و Chironomidae و گونه های ناشناس از ساقه و برگ گیاه و جلبک و در نهایت ذرات ماسه در معده ماهی مشاهده شد. براساس شاخص تهی بودن لوله گوارش (VI)، درصد میزان کل معده های خالی شیشه ماهی ۴۵ درصد بود، که نشاندهنده وضعیت نسبتاً پرخور این ماهی در این منطقه است (جدول ۴). براساس فرمول FP، در بین اقلام غذایی مورد مصرف این ماهیان، Gammaridae (Amphipod) با میزان ۳۳/۸ درصد و Daphnnidae (Cladocera) با ۲۰/۳ درصد، بیشترین اقلام غذایی را به خود اختصاص دادند، در نتیجه

جدول ۴: درصد فراوانی حضور غذا یا اولویت غذایی (*A. boyeri* (FP) به تفکیک ماه های نمونه برداری و گروه های سنی

ردیف	سن	ماه				خانواده	براساس رده و راسته	ردیف
		یک	دو	سه	چهار			
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶
۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵
۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳
۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲
۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱
۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰
۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹
۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸
۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷
۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶
۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵
۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴
۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۱	۱۵۲	۱۵۳
۱۵۴	۱۵۵	۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۱	۱۶۲
۱۶۳	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۷	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۰	۱۷۱
۱۷۲	۱۷۳	۱۷۴	۱۷۵	۱۷۶	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹	۱۸۰
۱۸۱	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۵	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۸	۱۸۹
۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷	۱۹۸
۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳	۲۰۴	۲۰۵	۲۰۶	۲۰۷
۲۰۸	۲۰۹	۲۱۰	۲۱۱	۲۱۲	۲۱۳	۲۱۴	۲۱۵	۲۱۶
۲۱۷	۲۱۸	۲۱۹	۲۲۰	۲۲۱	۲۲۲	۲۲۳	۲۲۴	۲۲۵
۲۲۶	۲۲۷	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۰	۲۳۱	۲۳۲	۲۳۳	۲۳۴
۲۳۵	۲۳۶	۲۳۷	۲۳۸	۲۳۹	۲۴۰	۲۴۱	۲۴۲	۲۴۳
۲۴۴	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۷	۲۴۸	۲۴۹	۲۵۰	۲۵۱	۲۵۲
۲۵۳	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۶	۲۵۷	۲۵۸	۲۵۹	۲۶۰	۲۶۱
۲۶۲	۲۶۳	۲۶۴	۲۶۵	۲۶۶	۲۶۷	۲۶۸	۲۶۹	۲۷۰
۲۷۱	۲۷۲	۲۷۳	۲۷۴	۲۷۵	۲۷۶	۲۷۷	۲۷۸	۲۷۹
۲۸۰	۲۸۱	۲۸۲	۲۸۳	۲۸۴	۲۸۵	۲۸۶	۲۸۷	۲۸۸
۲۸۹	۲۹۰	۲۹۱	۲۹۲	۲۹۳	۲۹۴	۲۹۵	۲۹۶	۲۹۷
۲۹۸	۲۹۹	۳۰۰	۳۰۱	۳۰۲	۳۰۳	۳۰۴	۳۰۵	۳۰۶
۳۰۷	۳۰۸	۳۰۹	۳۱۰	۳۱۱	۳۱۲	۳۱۳	۳۱۴	۳۱۵
۳۱۶	۳۱۷	۳۱۸	۳۱۹	۳۲۰	۳۲۱	۳۲۲	۳۲۳	۳۲۴
۳۲۵	۳۲۶	۳۲۷	۳۲۸	۳۲۹	۳۳۰	۳۳۱	۳۳۲	۳۳۳
۳۳۴	۳۳۵	۳۳۶	۳۳۷	۳۳۸	۳۳۹	۳۴۰	۳۴۱	۳۴۲
۳۴۳	۳۴۴	۳۴۵	۳۴۶	۳۴۷	۳۴۸	۳۴۹	۳۵۰	۳۵۱
۳۵۲	۳۵۳	۳۵۴	۳۵۵	۳۵۶	۳۵۷	۳۵۸	۳۵۹	۳۶۰
۳۶۱	۳۶۲	۳۶۳	۳۶۴	۳۶۵	۳۶۶	۳۶۷	۳۶۸	۳۶۹
۳۷۰	۳۷۱	۳۷۲	۳۷۳	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۶	۳۷۷	۳۷۸
۳۷۹	۳۸۰	۳۸۱	۳۸۲	۳۸۳	۳۸۴	۳۸۵	۳۸۶	۳۸۷
۳۸۸	۳۸۹	۳۹۰	۳۹۱	۳۹۲	۳۹۳	۳۹۴	۳۹۵	۳۹۶
۳۹۷	۳۹۸	۳۹۹	۴۰۰	۴۰۱	۴۰۲	۴۰۳	۴۰۴	۴۰۵
۴۰۶	۴۰۷	۴۰۸	۴۰۹	۴۱۰	۴۱۱	۴۱۲	۴۱۳	۴۱۴
۴۱۵	۴۱۶	۴۱۷	۴۱۸	۴۱۹	۴۲۰	۴۲۱	۴۲۲	۴۲۳
۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۷	۴۲۸	۴۲۹	۴۳۰	۴۳۱	۴۳۲
۴۳۳	۴۳۴	۴۳۵	۴۳۶	۴۳۷	۴۳۸	۴۳۹	۴۴۰	۴۴۱
۴۴۲	۴۴۳	۴۴۴	۴۴۵	۴۴۶	۴۴۷	۴۴۸	۴۴۹	۴۵۰
۴۵۱	۴۵۲	۴۵۳	۴۵۴	۴۵۵	۴۵۶	۴۵۷	۴۵۸	۴۵۹
۴۶۰	۴۶۱	۴۶۲	۴۶۳	۴۶۴	۴۶۵	۴۶۶	۴۶۷	۴۶۸
۴۶۹	۴۷۰	۴۷۱	۴۷۲	۴۷۳	۴۷۴	۴۷۵	۴۷۶	۴۷۷
۴۷۸	۴۷۹	۴۸۰	۴۸۱	۴۸۲	۴۸۳	۴۸۴	۴۸۵	۴۸۶
۴۸۷	۴۸۸	۴۸۹	۴۹۰	۴۹۱	۴۹۲	۴۹۳	۴۹۴	۴۹۵
۴۹۶	۴۹۷	۴۹۸	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۱	۵۰۲	۵۰۳	۵۰۴
۵۰۵	۵۰۶	۵۰۷	۵۰۸	۵۰۹	۵۱۰	۵۱۱	۵۱۲	۵۱۳
۵۱۴	۵۱۵	۵۱۶	۵۱۷	۵۱۸	۵۱۹	۵۲۰	۵۲۱	۵۲۲
۵۲۳	۵۲۴	۵۲۵	۵۲۶	۵۲۷	۵۲۸	۵۲۹	۵۳۰	۵۳۱
۵۳۲	۵۳۳	۵۳۴	۵۳۵	۵۳۶	۵۳۷	۵۳۸	۵۳۹	۵۴۰
۵۴۱	۵۴۲	۵۴۳	۵۴۴	۵۴۵	۵۴۶	۵۴۷	۵۴۸	۵۴۹
۵۵۰	۵۵۱	۵۵۲	۵۵۳	۵۵۴	۵۵۵	۵۵۶	۵۵۷	۵۵۸
۵۵۹	۵۶۰	۵۶۱	۵۶۲	۵۶۳	۵۶۴	۵۶۵	۵۶۶	۵۶۷
۵۶۸	۵۶۹	۵۷۰	۵۷۱	۵۷۲	۵۷۳	۵۷۴	۵۷۵	۵۷۶
۵۷۷	۵۷۸	۵۷۹	۵۸۰	۵۸۱	۵۸۲	۵۸۳	۵۸۴	۵۸۵
۵۸۶	۵۸۷	۵۸۸	۵۸۹	۵۹۰	۵۹۱	۵۹۲	۵۹۳	۵۹۴
۵۹۵	۵۹۶	۵۹۷	۵۹۸	۵۹۹	۶۰۰	۶۰۱	۶۰۲	۶۰۳
۶۰۴	۶۰۵	۶۰۶	۶۰۷	۶۰۸	۶۰۹	۶۱۰	۶۱۱	۶۱۲
۶۱۳	۶۱۴	۶۱۵	۶۱۶	۶۱۷	۶۱۸	۶۱۹	۶۲۰	۶۲۱
۶۲۲	۶۲۳	۶۲۴	۶۲۵	۶۲۶	۶۲۷	۶۲۸	۶۲۹	۶۳۰
۶۳۱	۶۳۲	۶۳۳	۶۳۴	۶۳۵	۶۳۶	۶۳۷	۶۳۸	۶۳۹
۶۴۰	۶۴۱	۶۴۲	۶۴۳	۶۴۴	۶۴۵	۶۴۶	۶۴۷	۶۴۸
۶۴۹	۶۵۰	۶۵۱	۶۵۲	۶۵۳	۶۵۴	۶۵۵	۶۵۶	۶۵۷
۶۵۸	۶۵۹	۶۶۰	۶۶۱	۶۶۲	۶۶۳	۶۶۴	۶۶۵	۶۶۶
۶۶۷	۶۶۸	۶۶۹	۶۷۰	۶۷۱	۶۷۲	۶۷۳	۶۷۴	۶۷۵
۶۷۶	۶۷۷	۶۷۸	۶۷۹	۶۸۰	۶۸۱	۶۸۲	۶۸۳	۶۸۴
۶۸۵	۶۸۶	۶۸۷	۶۸۸	۶۸۹	۶۹۰	۶۹۱	۶۹۲	۶۹۳
۶۹۴	۶۹۵	۶۹۶	۶۹۷	۶۹۸	۶۹۹	۷۰۰	۷۰۱	۷۰۲
۷۰۳	۷۰۴	۷۰۵	۷۰۶	۷۰۷	۷۰۸	۷۰۹	۷۱۰	۷۱۱
۷۱۲	۷۱۳	۷۱۴	۷۱۵	۷۱۶	۷۱۷	۷۱۸	۷۱۹	۷۲۰
۷۲۱	۷۲۲	۷۲۳	۷۲۴	۷۲۵	۷۲۶	۷۲۷	۷۲۸	۷۲۹
۷۳۰	۷۳۱	۷۳۲	۷۳۳	۷۳۴	۷۳۵	۷۳۶	۷۳۷	۷۳۸
۷۳۹	۷۴۰	۷۴۱	۷۴۲	۷۴۳	۷۴۴	۷۴۵	۷۴۶	۷۴۷
۷۴۸	۷۴۹	۷۵۰	۷۵۱	۷۵۲	۷۵۳	۷۵۴	۷۵۵	۷۵۶
۷۵۷	۷۵۸	۷۵۹	۷۶۰	۷۶۱	۷۶۲	۷۶۳	۷۶۴	۷۶۵
۷۶۶	۷۶۷	۷۶۸	۷۶۹	۷۷۰	۷۷۱	۷۷۲	۷۷۳	۷۷۴
۷۷۵	۷۷۶	۷۷۷	۷۷۸	۷۷۹	۷۸۰	۷۸۱	۷۸۲	۷۸۳
۷۸۴	۷۸۵	۷۸۶	۷۸۷	۷۸۸	۷۸۹	۷۹۰	۷۹۱	۷۹۲
۷۹۳	۷۹۴	۷۹۵	۷۹۶	۷۹۷	۷۹۸	۷۹۹	۸۰۰	۸۰۱
۸۰۲	۸۰۳	۸۰۴	۸۰۵	۸۰۶	۸۰۷	۸۰۸	۸۰۹	۸۱۰
۸۱۱	۸۱۲	۸۱۳	۸۱۴	۸۱۵	۸۱۶	۸۱۷	۸۱۸	۸۱۹
۸۲۰	۸۲۱	۸۲۲	۸۲۳	۸۲۴	۸۲۵	۸۲۶	۸۲۷	۸۲۸
۸۲۹	۸۳۰	۸۳۱	۸۳۲	۸۳۳	۸۳۴	۸۳۵	۸۳۶	۸۳۷
۸۳۸	۸۳۹	۸۴۰	۸۴۱	۸۴۲	۸۴۳	۸۴۴	۸۴۵	۸۴۶
۸۴۷	۸۴۸	۸۴۹	۸۵۰	۸۵۱	۸۵۲	۸۵۳	۸۵۴	۸۵۵
۸۵۶	۸۵۷	۸۵۸	۸۵۹	۸۶۰	۸۶۱	۸۶۲	۸۶۳	۸۶۴
۸۶۵	۸۶۶	۸۶۷	۸۶۸	۸۶۹	۸۷۰	۸۷۱	۸۷۲	۸۷۳
۸۷۴	۸۷۵	۸۷۶	۸۷۷	۸۷۸	۸۷۹	۸۸۰	۸۸۱	۸۸۲
۸۸۳	۸۸۴	۸۸۵	۸۸۶	۸۸۷	۸۸۸	۸۸۹	۸۹۰	۸۹۱
۸۹۲	۸۹۳	۸۹۴	۸۹۵	۸۹۶	۸۹۷	۸۹۸	۸۹۹	۹۰۰
۹۰۱	۹۰۲	۹۰۳	۹۰۴	۹۰۵	۹۰۶	۹۰۷	۹۰۸	۹۰۹
۹۱۰	۹۱۱	۹۱۲	۹۱۳	۹۱۴	۹۱۵	۹۱۶	۹۱۷	۹۱۸
۹۱۹	۹۲۰	۹۲۱	۹۲۲	۹۲۳	۹۲۴	۹۲۵	۹۲۶	۹۲۷
۹۲۸	۹۲۹	۹۳۰	۹۳۱	۹۳۲	۹۳۳	۹۳۴	۹۳۵	۹۳۶
۹۳۷	۹۳۸	۹۳۹	۹۴۰	۹۴۱	۹۴۲	۹۴۳	۹۴۴	۹۴۵
۹۴۶	۹۴۷	۹۴۸	۹۴۹	۹۵۰	۹۵۱	۹۵۲	۹۵۳	۹۵۴
۹۵۵	۹۵۶	۹۵۷	۹۵۸	۹۵۹	۹۶۰	۹۶۱	۹۶۲	۹۶۳
۹۶۴	۹۶۵	۹۶۶	۹۶۷	۹۶۸	۹۶۹	۹۷۰	۹۷۱	۹۷۲
۹۷۳	۹۷۴	۹۷۵	۹۷۶	۹۷۷	۹۷۸	۹۷۹	۹۸۰	۹۸۱
۹۸۲	۹۸۳	۹۸۴	۹۸۵	۹۸۶	۹۸۷	۹۸۸	۹۸۹	۹۹۰
۹۹۱	۹۹۲	۹۹۳	۹۹۴	۹				




شکل ۲: درصد فراوانی غذاهای مهم در لوله گوارش (FP) شیشه ماهی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (۹۳-۱۳۹۲)


ماهی می توان محسوب کرد. Daphnnidae (Cladocera) (۱۹/۶ درصد)، Bosminidae (Cladocera) (۱۰/۹ درصد) با میزانی بسیار کم در جایگاه دوم قرار دارند (شکل ۳). در ماه شهریور نیز Gammaridae (Amphipod) (۴۵ درصد) در جایگاه اول قرار دارد، اما بعنوان غذای اصلی بحساب نمی آید، در جایگاه دوم نیز Daphnnidae (Cladocera) (۲۵ درصد) قرار دارد و سایر اقلام نیز بعنوان غذای اتفاقی مورد استفاده این ماهیان قرار گرفتند (شکل ۳). بررسی فراوانی (کمیت) اقلام غذایی در لوله گوارش این ماهی در این ماهها حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه Gammaridae (Amphipod) بتهنهایی حدود ۵۲/۹ درصد تعداد طعمه ها را تشکیل داده است، اما در آذر ماه میزان آن بشدت کاهش یافته و به صفر رسیده و Xestoleberididae (Ostracoda) با ۵۰ درصد تعداد این طعمه ها، این کاهش را جبران نموده است و در بین ۵ قلم دیگر غذایی، Daphnnidae (Cladocera) جایگاه دوم را در محتویات لوله گوارش آن ماه دارا بود. بنابراین ملاحظه می گردد که در این پنج ماه بررسی، بنتوزها شامل Xestoleberididae (Ostracoda) در آذر ماه و Gammaridae (Amphipod) در چهار ماه دیگر (دی، اسفند، اردیبهشت و شهریور) نسبت به سایر اقلام غذایی، بیشترین درصد را بخود اختصاص دادند، اما نتوانستند غالبیت بارزی را به عنوان غذای اصلی در طی ماههای بررسی شده بدست بیاورند. در واقع حجم زیادی از تعداد نمونه های طعمه را، غذای جانبی تشکیل داد. تقسیم بندی اقلام غذایی براساس رده جانوری در طی ماههای نمونه برداری نیز، نشان از جانبی

براساس شاخص تهی بودن لوله گوارش (VI)، بیشترین میزان خالی معده این ماهی در شهریور ماه با میزان ۵۸/۳ درصد مشاهده شد (جدول ۴). بررسی اولویت غذایی طعمه های بلعیده شده (FP) توسط شیشه ماهی در منطقه ساحل نیروگاه نکا نشان می دهد که در آذر ماه Ostracoda (Xestoleberididae) (۵۰ درصد) در تمامی نمونه ماهیان مورد بررسی مشاهده می شود و چون بالای ۵۰ درصد نیست، بنابراین بعنوان غذای اصلی محسوب نمی شود. پس از آن Daphnnidae (Cladocera) (۱۹ درصد) بعنوان غذای ثانویه مصرف شده است. سایر اقلام غذایی نیز بعنوان غذاهای اتفاقی معرفی می شوند. نکته جالب در آذر ماه این است که فقط در این ماه گاماروس جای خود را به یک گونه از رده استراکودها داده است (شکل ۳). در دی ماه Gammaridae (Amphipod) (۴۲/۸ درصد) را جزء غذای جانبی ارشد برای ماهی محسوب شد. همچنین Daphnnidae (Cladocera) (۱۲/۵ درصد) و Bosminidae (Cladocera) (۹/۹ درصد) نیز بعنوان غذای جانبی در جایگاه دوم و سایر اقلام غذایی به عنوان غذاهای اتفاقی محسوب شدند (شکل ۳). در اسفند ماه نیز غذای اصلی وجود ندارد و Gammaridae (Amphipod) (۳۰/۵ درصد)، Daphnnidae (Cladocera) (۲۸/۲ درصد) جزء غذاهای جانبی ماهی محسوب شدند و سایر اقلام بعنوان غذاهای اتفاقی محسوب شدند (شکل ۳). در اردیبهشت ماه بیشترین حضور Gammaridae (Amphipod) با ۵۲/۹ درصد را می توان دید و براساس شاخص FP این طعمه را جزء غذای اصلی

بودن غذای مصرف شده می دهد (شکل ۴). براساس درصد تنوع طعمه در ماه‌های نمونه برداری، حدود ۶۶/۷ درصد از طعمه های موجود در اسفند ماه مشاهده شد (جدول ۴).




شکل ۳: درصد موجودات غالب تغذیه شده براساس خانواده، در ماههای نمونه برداری (۱۳۹۲-۹۳)




شکل ۴: درصد موجودات غالب تغذیه شده براساس رده جانوری، در ماههای نمونه برداری (۱۳۹۲-۹۳)

براساس شاخص تهی بودن لوله گوارش (VI)، بیشترین میزان خالی معده این ماهی در سن ۱ سالگی با میزان ۵۷/۱ درصد مشاهده شد (جدول ۴). بررسی کمیت اقلام غذایی در معده و روده شیشه ماهی نشان می دهد که در ماهیان ۱ ساله غذای اصلی وجود نداشته و (Amphipod) Gammaridae با ۲۸/۵ درصد و (Cladocera) Daphnnidae با ۲۱/۸ درصد بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داده و بعنوان طعمه جانبی از آنها می توان یاد کرد، همچنین سایر اقلام غذایی نیز بعنوان طعمه اتفاقی هستند (شکل ۵). در محتویات لوله گوارش ماهیان ۲ ساله (Amphipod) Gammaridae در رتبه نخست با ۳۸/۶ درصد و پس از آن Daphnnidae (Cladocera) با ۲۲/۲ درصد، بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داده و اما بعنوان طعمه جانبی از آنها استفاده شد، سایر اقلام غذایی نیز بعنوان طعمه اتفاقی نامیده می شوند (شکل ۵). در محتویات لوله گوارش ماهیان ۳ ساله (Amphipod) Gammaridae در رتبه نخست با ۴۰/۳ درصد و پس از آن (Cladocera) Daphnnidae با ۲۲/۱ درصد در رتبه بعدی قرار داشتند، اما براساس شاخص (FP) شد (جدول ۴).

بعنوان غذای جانبی بوده و جایگاه غذای اصلی را ندارد. سایر اقلام غذایی نیز بعنوان طعمه اتفاقی نامیده می شوند (شکل ۵). در ماهیان ۴ ساله نیز (Ostracoda) Gammaridae به همراه Xestoleberididae (Amphipod) بترتیب با ۲۲/۷ و ۱۸/۲ درصد، بیشترین درصد طعمه خورده شده را تشکیل داده، اما جزء غذاهای اصلی برای ماهیان این رده سنی بحساب نمی آید (غذای جانبی)، سایر اقلام غذایی نیز بعنوان طعمه اتفاقی شناخته شد (شکل ۵). بر طبق این داده ها، بیشترین درصد طعمه مشاهده شده را (Amphipod) Gammaridae با ۴۰/۳ درصد در سنین ۳ سالگی تشکیل دادند. در واقع می توان گفت که با افزایش سن این ماهی، تغییر خاصی در میزان اولویت غذایی آنها رخ نمی دهد. در تقسیم بندی اقلام غذایی براساس رده جانوری نیز، در گروههای سنی از طعمه خاصی بر طبق شاخص FP بعنوان غذای اصلی استفاده نمی کند (شکل ۶). براساس میزان تنوع طعمه مشاهده شده در گروههای سنی، حدود ۹۳/۳ درصد از طعمه های موجود در ۲ سالگی مشاهده شد (جدول ۴).



شکل ۵: درصد فراوانی موجودات غالب تغذیه شده براساس خانواده، در گروههای سنی (۹۳-۱۳۹۲)



شکل ۶: درصد فراوانی موجودات غالب تغذیه شده براساس رده جانوری، در گروه‌های سنی (۹۳-۱۳۹۲)

بحث

بررسی ماهیان در بوم سازگانه‌های آبی بدلائل متعددی ازجمله بررسی تکاملی، بوم شناختی، رفتار شناسی، حفاظتی، مدیریت منابع آبی و بهره برداری ذخایر گونه های اقتصادی حایز اهمیت بوده (Lagler *et al.*, 1962) و با وجود فشار فزاینده ای که در اثر رشد جمعیت بر منابع محدود کنونی وارد می شود نیاز مبرمی به شناخت هر چه بهتر خصوصیات آبزیان و محیط زندگی آنها بمنظور اعمال مدیریت صحیح احساس می شود (وژوقی و مستجیر، ۱۳۷۹). داده های حاصل از بررسی شاخصهای تغذیه ای در این ماهیان حاکی از این امر است که این ماهیان با میانگین ($\pm$ انحراف معیار) طول نسبی لوله گوارشی (RLG) 0.46 ± 0.06 و براساس آنچه که در منابع عنوان شده (بیسواس، ۱۹۹۹) جزء ماهیان گوشتخوار محسوب می شوند. با توجه به مقدار بدست آمده برای شاخص تهی بودن لوله گوارشی (VI) ماهیان بررسی شده نسبتاً پرخور (۴۵ درصد) بوده اند که نشانه شرایط خوب تغذیه ای برای این ماهی می باشد. میانگین شدت تغذیه (IF) محاسبه شده در این ماهیان معادل 535 ± 0.06 است که براساس آنچه که در منابع آمده است (Shorygin, 1952) در کل این ماهیان از تغذیه

مطلوبی برخوردار هستند، زیرا بدلیل گسترده بودن حرکت در ستون آب از هر موجودی در منطقه خود استفاده می کند و آن را به یک شکارچی فرصت طلب تبدیل کرده است. بررسی شدت تغذیه در ماههای نمونه برداری شده نیز حاکی از این امر است که این ماهیان بالاترین میزان شدت تغذیه را در ماه اسفند و قبل از شروع دوره تخمیزی در فصل بهار دارند (در طول تخمیزی تغذیه به حداقل می رسد) (Fish Base, 2014)، کمترین میزان شدت تغذیه نیز در آذر ماه مشاهده شده است. همانگونه که در نتایج ملاحظه شد، حداکثر نمونه طعمه مشاهده شده براساس سن در معده شیشه ماهی را رده های کلاوسرا و آمفی پودا بغیر از ۴ سالگی که استراکودا غالب بود و کلاوسرا و آمفی پودا در رده های بعدی قرار داشتند، تشکیل دادند. بنابراین، رده آمفی پودا از بنتوزها و رده کلاوسرا از زئوپلانکتونها بعنوان رده های معمول در نمونه های طعمه شیشه ماهی دریای خزر می توان نام برد (شکل ۶). در مطالعه حاضر رفتار تغذیه ای فرصت طلب و برتری های مشخص شده سخت پوستان کوچک را نشان می دهد که تا حدودی با مطالعات دیگران در مناطق دیگر برابری دارد (Gon and Castel *et al.*, 1977; Ben-Tuvia, 1983; Bartulovic *et al.*, 2004).

اگرچه بر اساس منابع، این ماهی را پلانکتون خوار و بطور انحصاری در مواقعی که شکار زئوپلانکتونها کم باشد آنها را بنتوزخوار معرفی کرده اند (Trabelsi *et al.*, 1994)؛ (Bartulovic *et al.*, 2004)، اما در مطالعه حاضر شیشه ماهی دریای خزر واقع در نیروگاه نکا در تمام فصول بمیزان برابری هم از زئوپلانکتونها و هم از بنتوزها بعنوان غذای جانبی استفاده کرده است. بنابراین تفاوت‌های مشاهده شده در فراوانی طعمه های صید شده توسط این ماهیان در فصول مختلف هم می تواند ناشی از تفاوت در پراکنش صید و صیادی در اعماق و مناطق مختلف دریا در فصول مختلف سال باشد (Doulka *et al.*, 2013).

طبق مطالعات انجام شده، شکار طعمه تابع تراکم و اندازه طعمه است (Lazzaro, 1987). بدین منظور در تحقیق حاضر نیز، ترکیب فصلی محتویات معده شیشه ماهی تابع ترکیب فصلی جامعه زئوپلانکتونی در دریای خزر تا حدودی نبوده، زیرا بیشترین اقلام غذایی مشاهده شده به نسبت تقریباً مساوی در طول ماههای نمونه برداری وجود دارد و در نتیجه بیشتر بدنبال کسب غذای بیشتر در لایه های ستون آب (شکارچی فرصت طلب) می باشد. این مطالعه نشان می دهد که شیشه ماهی تحت رفتار تغذیه ای فرصت طلب قرار دارد و هر بار اقلام طعمه در دسترس را مورد هدف قرار می دهد. بر این اساس از بنتوزها، آمفی پودها را بعنوان طعمه مناسب در دسترس برای شیشه ماهی در طی ماههای بررسی شده بغیر از آذر ماه که استراکودها غالب هستند می توان نامید. همچنین از زئوپلانکتونها نیز، رده کلاوسرها را به کارآمدترین انتخاب طعمه برای شیشه ماهی در طی فصول می توان نام برد. به گزارش مارکوویچ، تغذیه شیشه ماهی در دمای زیر ۸ درجه سانتیگراد متوقف می شود (Markevich, 1977). در دریای خزر، پایین ترین دما در طول فصول برای خزر جنوبی، به ۱۰ درجه در لایه میانی (۴۰ متر) و ۶ درجه در لایه عمیق (۶۰۰ متر) می رسد (علیزاده، ۱۳۸۴)، اما نکته ای که این گونه را به فعالیت تغذیه ای در دمای سرد سال تشویق می کند، عامل گرمای ناشی از نیروگاه نکا در نزدیکی محل صید این ماهی می تواند باشد. در نتیجه شدت تغذیه به فعالیت متابولیکی ماهی، دسترس بودن و مناسب بودن اقلام طعمه وابسته است که در این منطقه تولید پلانکتونی و بنتوزی در فصول سرد

سال نیز صورت می گیرد. فعالیت تغذیه ای شیشه ماهی براساس شاخص سیری در ماههای نمونه برداری که معرف هر فصل می باشد، در شکل ۱ نشان داده شده است، بنابراین حداکثر میزان شاخص سیری در ماه اسفند ثبت شد که نشان دهنده این مقصود است که عامل دمای فصلی تأثیری در کاهش میزان تغذیه ندارد. براساس تحقیق حاضر، حداکثر میزان شاخص خالی بودن لوله گوارشی شیشه ماهی در دریای خزر در طول اواخر تابستان تا پاییز و بیشتر در تابستان (۵۸ درصد از کل) بود. مطالعات انجام شده در دیگر مناطق نیز این میزان از شاخص خالی بودن لوله گوارشی در فصول بین تابستان و پاییز را نشان می دهند (Mantilacci *et al.*, 1990؛ Bartulovic *et al.*, 2004). در تمام موارد، مواد غذایی شیشه ماهی در طول دوره تابستان و پاییز از آمفی پودها و کلاوسرها تشکیل شده است. بنظر می رسد که در دریای خزر، طعمه های از خانواده Gammaridae (Amphipod) و Daphnnidae (Cladocera) (بغیر از فصل پاییز گونه Xestoleberididae (Ostracoda) بیشترین کمیت طعمه را برای شیشه ماهی دارند. بنابراین اولویت شیشه ماهی به این گونه ها، نشان از سازگاری موثر به وضعیت تغذیه ای و غالبیت این اقلام طعمه در دریای خزر دارد. دربرخی از شیشه ماهی ها انگل معده (کرم) پیدا شد، که عمدتاً متعلق به نماتودها (جدول ۴) می باشد. این اقلام توسط دیگر نویسندگان نیز بعنوان طعمه در محتویات معده شیشه ماهی ثبت شده است (Moretti *et al.*, 1959؛ Gon and Ben-Tuvia, 1983). براساس تحقیقات انجام شده توسط دیگر نویسندگان، برخی از گونه های نماتود را انگل و برخی دیگر غذای این ماهی معرفی کرده اند (Danilova, 1991). با توجه به نماتدهای مشاهده شده، معلوم نیست که آنها انگل (Gon and Ben-Tuvia, 1983) و یا جزء غذای شیشه ماهی ها باشند (Fouda, 1995). در مطالعه حاضر براساس شواهد، نماتودها را بعنوان انگل می توان معرفی کرد، زیرا تمام آنها در داخل بدن و در مجاورت معده شیشه ماهی ها مشاهده شدند. اکثر نماتودها در دی ماه دیده شدند، که احتمالاً مرحله زمستان گذرانی خود را در بدن شیشه ماهی بعنوان میزبان سپری می کنند (Doulka *et al.*, 2013؛ Chrisafi *et al.*, 2007). در مطالعات انجام شده

- Bartulovic, V., Lucic, D., Conides, A., Glamuzina, B., Dulcic, J., Hafner, D. and Batistic, M., 2004.** Food of sand smelt, *Atherina boyeri* Risso, 1810 (Pisces: Atherinidae) in the estuary of the Mala Neretva River (middle-eastern Adriatic, Croatia). *Journal of Marine Sciences*. 68, 597–603.
- Castel, J., Cassifour, O. and Labourg, P.J., 1977.** Croissance et modifications du regime alimentaire d'un teleoste'en mugiliforme: *Atherina boyeri* Risso, 1810 dans les e'tangs saumâtres du bassin d'Arcachon. *Vie Milieu*. 27, 385–410.
- Chrisafi, E., Kaspiris P. and Katselis, G., 2007.** Feeding habits of sand smelt (*Atherina boyeri*, Risso 1810) in Trichonis Lake (Western Greece). *Journal of Applied Ichthyology*. 23, 209–214.
- Danilova, M.M., 1991.** Diet of juvenile silversides, *Atherina boyeri*, from the Black Sea. *Journal of Ichthyology*. 31, 137–145.
- De Moraes, MFPG., de Freitas Barbola I. and Fernanda Duboc L., 2004.** Feeding habits and morphometric of digestive tracts of *Geophagus brasiliensis* (Osteichthyes, Cichlidae), in a lagoon of high Tibagi river, Parana state, Brazil.
- Doulka, E., Kehayias G., Chalkia E. and Leonardos I.D., 2013.** Feeding strategies of *Atherina boyeri* (Risso 1810) in a freshwater ecosystem. *Journal of Applied Ichthyology*, 29, 200–207.
- سایر مناطق نیز، این انگل را در سنن پائین ماهی دیدند و ماهی را اولین میزبان انگل معرفی کردند (Doulka et al., 2013؛ Chrisafi et al., 2007). در مطالعه حاضر، نمونه ای از حشرات رده دیپترا در لوله گوارشی ماهی مشاهده شد که در منبعی از این حشره بعنوان تغذیه شیشه ماهی اشاره شده است (Fishbase, 2014). این حشره رده دیپترا از دو خانواده مجزا شامل Chironomidae (دی ماه) و Tipulidae (آذر ماه) بودند (جدول ۴).
- نتیجه چنین وضعیت تغذیه ای گونه *A. boyeri* می تواند بدین دلیل باشد که این ماهی یا غذای غالبی را در این منطقه پیدا نکرده و یا اینکه بعلت شکارچی فرصت طلب بودن، بدنبال طعمه خاصی برای تغذیه در این منطقه نمی گردد. اما چیزی که در اینجا مهم است، این گونه در دریای خزر با استراتژی خاص تغذیه ای (شکار انتخابی) براساس میزان فراوانی طعمه، در نوعی از تعامل با محیط زندگی خود سازگار شده است.
- ### منابع
- بیرشتین . ی.آ.، وینوگرافد، ل. گ.، کونداکف، ن. ن.، کون، م. س.، استاخوا، ت. و. و ن. ن. رومانوا. ۱۹۶۸. اطلس بی مهرگان دریای خزر. انتشارات مسکو. ترجمه ل. دلیناد و ف. نظری. ۱۳۷۸. موسسه تحقیقات شیلات ایران.
- بیسواس، اس. پی. ۱۹۹۹. مبانی زیست شناسی ماهی. ترجمه عادل، ا. ۱۳۷۸. نشریه علوم کشاورزی.
- علیزاده، ح. ۱۳۸۴. مقدمه ای بر ویژگیهای دریای خزر. انتشارات نوربخش تهران.
- وثوقی، غ. و مستجیر، ب. ۱۳۷۹. ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران. شماره ۲۱۳۲. چاپ چهارم.
- Al-Hussainy, AH., 1949.** On the functional morphology on the alimentary tract of some fishes in relation to difference in their feeding habits, *Quart. Journal of Marine Science*. 9(2), 190-240.

- Euzen, O., 1987.** Food habits and diet composition of some fish of Kuwait. Kuwait Bull. Marine Sciences, 9, 58-69.
- Fishbase, 2014.** http://www.fishbase.ir/species/Caspiansea/Atherina_boyeri.html
- Fouda, M.M., 1995.** Life history strategies of four small-size fishes in the Suez Canal, Egypt. Journal of Fish Biology, 46(4), 687-702.
- Gisbert, E., Cardona L. and Castello' F., 1996.** Resource partitioning among planktivorous fish larvae and fry in a Mediterranean coastal lagoon, Estuary. Coastal and Shelf Science, 43, 723-735.
- Gon, O. and Ben-Tuvia A., 1983.** The biology of Boyer's sand smelt, *Atherina boyeri* Risso in the Bardawil Lagoon on the Mediterranean coasts of Sinai. Journal of Fish Biology. 22, 537-547.
- IUCN, 2014.** <http://www.iucnredlist.org/details/biblio/2352/0>.
- Lagler, K.F., Bardach, J.E. and Miller, R.R., 1962.** Ichthyology, 1st ed. John Wiley & Sons, New York. 545P.
- Lazzaro, X., 1987.** A review of the planktonivorous fishes: Their evaluation, feeding behaviors, selectivities and impact. Hydro -biology, 146, 97-167.
- Mantilacci, L., Mearelli, M., Giovinazzo, G. and Lorenzoni, M., 1990.** Accrescimento e alimentazione dell'atterino (*Atherina boyeri* Risso, 1810) dell'ago Trasimeno. Riv. Idrobiol, 29, 309-327.
- Markevich, N.B., 1977.** Some morphological indices of the silverside *Atherina movhon pontica*, in the Aral Sea in connection with age structure of its population. Journal of Ichthyologia, 17, 618-626.
- Moretti, G., Gianotti, F.S. and Giganti, A., 1959.** I l "latterino" (*Atherina mochon* Cuv.) nel Trasimeno (biometria, regime dietetic, pescae parassitismo). Rivista di Biologia, 51, 3-38.
- Shorygin, A.A., 1952.** Feeding and food relations between fishes of the Caspian Sea, Pishchepromizdat, Moscow, 268P.
- Trabelsi, M., Kartas, F. and Quignard, J.P., 1994.** Comparison of diet between a marine and a lagoon of *Atherina boyeri* from Tunisian coasts. Vie Milieu, 44, 117-123.
- Vizzini, S. and Mazzola, A., 2005.** Feeding ecology of the sand smelt *Atherina boyeri* (Risso, 1810) (Osteichthyes, Atherinidae) in the western Mediterranean: evidence for spatial variability based on stable carbon and nitrogen isotopes. Environmental Biology of Fishes, 72, 259-266.

The diet of big-scale sand smelt *Atherina boyeri caspia* (Risso, 1810) in the southeastern coast of the Caspian Sea

Amri Sahebi A.¹; Taghavi H.^{1*}; Fazli H.²

* taghavi25@yahoo.com

1-Department of Marine Biology, College of Marine Sciences, Pardis University of Mazandaran, Mazandaran province, Babolsar, Iran

2-Institute Ecology of the Caspian Sea, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization

Key words: Big-scale sand smelt fish, Southeastern of Caspian Sea, Diet, Feeding intensity

Abstract

Big-scale sand smelt is one of the fishes with high ecological value, which consume by fishes such as sturgeon in the Caspian Sea. In this study, 191 samples of Big-scale sand smelt from southeast coast of the Caspian Sea were collected seasonally from December 2013 to September 2014. In the present study, food items and the relative index of gastrointestinal (RLG), stomach emptiness index (VI) and feeding intensity (IF) were determined. The fork length, weight and age (mean $\pm$ SD) were 7.70 ± 1.09 cm, 3.64 ± 1.49 g and 2.00 ± 0.81 year, respectively. This fish with a relative gastrointestinal tract length of 0.46 ± 0.06 (mean $\pm$ Standard Deviation) can be considered as a carnivorous fish. The average of empty stomach was 45% showing big-scale sand smelt is a relatively voracious feeder. The average intensity of feeding (mean $\pm$ Standard Deviation) 535 ± 221.21 , as a moderate level for this fish in the region. *Gammarus* (benthos) and *Daphnia* (zooplankton) were the favored food for this fish. This study also showed opportunistic hunting activities of this fish.

*Corresponding author