



مقاله علمی - پژوهشی:

ارزیابی وضعیت اوتروپی خلیج گرگان با شاخص کارلسون (CTSI)^۱

پریسا ملکی^۱، رحمان پاتیمار^{۲*}، حجت الله جعفریان^۱، عبدالرسول سلمان ماهینی^۲، رسول قربانی^۲، محمد قلی زاده^۱، محمد هرسیج^۱

*rpatimar@yahoo.com

- ۱- گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران
- ۲- گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ دریافت: آذر ۱۴۰۰

چکیده

طی سال‌های گذشته، اوتروفیکاسیون در اثر فعالیت‌های انسانی به عنوان یک مسئله اصلی اکولوژیک برای مناطق ساحلی شناخته شده است که منجر به تغییرات چشمگیری در فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی تعیین وضعیت اوتروپی خلیج گرگان بود که با استفاده از شاخص کارلسون که یکی از بهترین روش‌های ارزیابی وضعیت اوتروپی پیکره‌های آبی می‌باشد، انجام شد. منطقه مورد مطالعه، خلیج گرگان بود که در جنوب شرق دریای خزر واقع شده است. نمونه‌برداری به صورت فصلی با سه تکرار از تابستان ۱۳۹۷ لغایت بهار ۱۳۹۸ در ۲۳ ایستگاه انجام شد. فاکتورهای نیتрат، فسفات، کلروفیل-آ، عمق و شفافیت اندازه‌گیری شد. مقادیر شاخص کارلسون بر حسب کلروفیل-آ نشان داد که خلیج در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان در وضعیت اوتروف (با اعداد به ترتیب ۵۳/۴۸، ۵۳/۶۹ و ۵۳/۶۷) و در فصل بهار در وضعیت مزوتروف (با عدد ۴۲/۷۵) قرار داشت. بر حسب میزان فسفات، در فصل‌های پاییز و زمستان اوتروف (با اعداد ۶۹/۲۲ و ۵۵/۱۷) و در فصل‌های تابستان و بهار در وضعیت اولیگوتروف (با اعداد ۲۶/۷۵ و ۳۵/۳۰) قرار داشت و بر حسب شفافیت در هر چهار فصل در وضعیت اوتروف (با اعداد به ترتیب ۶۳/۳۳، ۶۱/۶۱، ۶۰/۹۳، ۶۱/۵۸) قرار داشت. به طور کلی، نتایج نشان داد که خلیج گرگان در زمان نمونه‌برداری در این پژوهش، در محدوده مزوتروف به اوتروف قرار داشت. بنابراین، مدیریت حفاظتی بیشتر این اکوسیستم با ارزش ضروری است.

لغات کلیدی: خلیج گرگان، اوتروپی، شاخص کارلسون، کلروفیل-آ، عمق، نیترات، فسفات

*نویسنده مسئول

^۱Carlson's Trophic State Index

مقدمه

در عصر حاضر، انسان‌ها فشار و تنش‌های بی‌سابقه‌ای را بر بوم سامانه‌های آبی وارد نموده‌اند. فعالیت‌های انسانی نظیر تغییر زیستگاه، آلودگی و بهره‌برداری بیش از حد از منابع زنده اثرات زیان‌بخشی بر سطوح تنوع زیستی و تأمین منابع زیستی برای نسل‌های آینده وارد ساخته است (Loreau et al., 2001; Jackson et al., 2001).

اوتروفیکاسیون تعاریف مختلفی دارد. تعریف کلی اوتروفیکاسیون عبارتست از ورود بیش از حد مواد مغذی از منابع مختلف به بدنه‌ی آب که با سایر عوامل (دما، نور، اکسیژن) باعث افزایش تولیدات اولیه اکوسیستم می‌شود (Tusseau-Vuillemin, 2001; Jorgensen, 2003; Nixon, Bukata, 2005; Khan and Ansari, 2005). اوتروفیکاسیون را به عنوان "افزایش در میزان ورود مواد آلی به یک اکوسیستم" تعریف نمود. وضعیت اوتروفیکاسیون بدنه آب را می‌توان به الیگوتروفیک، مزوتروفیک، اتروفیک و هایپرتروفیک طبقه‌بندی کرد (Carlson, 1977). برخی از پارامترهای مورد استفاده برای تعیین شاخص‌های اوتروفیکاسیون شامل: اکسیژن محلول، فسفر کل، غلظت کلروفیل، دما، عمق دیسک، نیتрат، ذرات معلق و شوری است (Moncheva et al., 2002). از سویی، عوامل متعددی بر تراکم فیتوپلانکتون‌ها مؤثرند که فاضلاب‌های شهری و صنعتی، فعالیت‌های آبی‌پروری، ژئولوژی و ساختار موفولوژی منطقه، فصولات دامی، کودهای کشاورزی، فرآیندهای جوی (باران‌های اسیدی) و گرم شدن هوای زمین از مهم‌ترین این عوامل می‌باشند (Field et al., 1998; Smith, 2007; Kalytite, 2007; Cloern et al., 2014). مدل‌ها و شاخص‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای سنجش و ارزیابی کیفی آبهای سطحی و یوتروفیکاسیون در آبهای شیرین و آب دریا در سطح دنیا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است (Coelho et al., 2007; شیخستانی, ۱۳۸۰).

خلیج گرگان در انتهای جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است. بوم‌شناسی خلیج گرگان تحت تأثیر دریای خزر، رودخانه‌های مجاور و شبه جزیره میانکاله است که نقش

مهمی در رشد و تکثیر حیوانات آبی، ماهیان استخوانی و غضروفی و نیز جذب پرندگان مهاجر زمستانی دارد (جوانی و همکاران, ۱۳۹۳; Karbassi and Amirnezhad, 2004; Sharbaty et al., 2010).

ارزیابی وضعیت تروفی با کمک شاخص کارلسون در منابع آبی مختلف، گزارش‌های زیادی منتشر شده است. از جمله فلاح و همکاران (۱۳۹۷)، وضعیت تروفی تالاب بین‌المللی انزلی را با استفاده از شاخص کارلسون ارزیابی و بیان داشتند که میزان تروفی بر اساس فسفات کل و ازت کل، در اغلب ایستگاه‌ها وضعیت هایپرتروف تا هایپرتروف حاد دارد. عابدینی و همکاران (۱۴۰۰) روند تغییرات شاخص تغذیه‌گرایی (TSI) دریاچه چیتگر طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۲ بیان داشتند که بر مبنای ارزیابی چند پارامتری در ابتدای آبیگری دریاچه مصنوعی چیتگر شاخص تروفیک در حد دریاچه‌های اولترالیگوتروف و طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۵ به سطح مزوتروف نزدیک شده و بعد از تابستان ۱۳۹۷ شاخص تغذیه‌گرایی طی روند کاهشی تقریباً به تراز اولیه برگشته است. جباری و منتصری (۱۳۹۹) شرایط تروفی تالاب کانی برازان مهاباد با استفاده از فسفر زیست فراهم رسوبات و شاخص کارلسون بررسی و گزارش دادند که شرایط تالاب در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب در وضعیت مزوتروفیک خفیف، الیگوتروف، مزوتروفیک و مزوتروفیک حاد قرار دارد. ویسی و همکاران (۱۳۹۳) پایش پدیده تغذیه‌گرایی در دریاچه سد مخزنی اکباتان را با بهره‌گیری از شاخص غنی‌شدگی کارلسون انجام دادند و بیان داشتند، مغذی‌ترین حالت تغذیه‌گرایی مربوط به مرداد ماه و کمترین حالت مربوط به بهمن ماه بوده است و نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که مخزن در فصل زمستان به سمت شرایط نیمه مغذی بهبود یافته است. مخلوق و همکاران (۱۳۹۴) پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه‌گرایی دریاچه سد آرتد سنج را با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی‌شدگی کارلسون انجام داده و نشان دادند که بر اساس کلروفیل-آ سطح تروفیک در مخزن سد و نیز ایستگاه‌های مختلف عموماً مزوتروف بود درحالی‌که بر اساس سایر فاکتورها اوتروف تا

دلیل شرایط اکولوژیک خاص خلیج گرگان و به تبع آن مشاهده فون و فلور خاص و نیز کمبود مطالعات وضعیت اوتروفری خلیج به خصوص ارزیابی وضعیت اوتروفری آن براساس فاکتورهای زیستی، بررسی و مطالعه اوتروفیکاسیون در خلیج گرگان با هدف ارزیابی وضعیت تروفری آن حائز اهمیت می باشد و مطالعات متوالی در این زمینه جهت حفظ کیفیت آب در این منطقه به دلیل فون و فلور خاص آن و اهداف آبی‌پروری بسیار ضروری می باشد.

مواد و روش کار

با توجه به شرایط اکولوژیک منطقه و وسعت خلیج گرگان، ایستگاه‌ها به نحوی در نظر گرفته شدند که تمام سطح خلیج گرگان پوشش داده شود. موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونه برداری در شکل ۱ نشان داده شده است. نمونه برداری به صورت فصلی (۴ فصل) با سه تکرار از تابستان ۱۳۹۷ لغایت بهار ۱۳۹۸ در ۲۳ ایستگاه انجام شد.


پارامتر کلروفیل-آ (میکروگرم برلیتر) با دستگاه آلگاتورچ ساخت کمپانی bbe Moldaenke GmbH و پارامترهای عمق (سانتی متر) توسط متر لیزری HONDEX و شفافیت (سانتی متر) به وسیله دیسک سچی در محل اندازه گیری شد.

نیتريت (میلی گرم در لیتر)، نیترات (میلی گرم در لیتر) و فسفات (میلی گرم در لیتر)، پس از انتقال نمونه‌ها با ظروف یونولیتی حاوی یخ از خلیج گرگان به آزمایشگاه، با روش اسپکتروفتومتری (APHA, 2000, 2005؛ استاندارد ملی ایران، ۱۳۸۱) در آزمایشگاه شیمی دانشگاه گنبدکاووس اندازه گیری شد.

برای ارزیابی خلیج گرگان از نظر سطح تغذیه‌ای و وضعیت اوتروفیکاسیون پس از اندازه گیری پارامترهای عمق رویت (عمق سکشی)، فسفر کل، نیتروژن کل و کلروفیل-آ، بر اساس مدل کارلسون اقدام به تعیین سطح تروفری گردید (Carlson, 1977) (جدول ۱).

هایپرتروف ارزیابی شد. طاهری تیزرو و قشقایی (۱۳۹۵) وضعیت تغذیه‌گرایی دریاچه سد اکباتان را با استفاده از شاخص کارلسون تعیین و بیان داشتند که با توجه به مقدار به دست آمده برای این شاخص، دریاچه در نقاط ورودی بیشتر در معرض تغذیه‌گرایی قرار دارد و فسفر عامل کنترل تغذیه‌گرایی این سیستم می باشد. رحمتی و همکاران (۱۳۹۱) وضعیت تروفری آب‌بندان طبیعی مرزن آباد بابل را با شاخص کارلسون بررسی و گزارش دادند که این آب‌بندان در وضعیت اوتروفری و در معرض ورود به شرایط هایپرتروفری قرار دارد. اما بررسی مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی وضعیت تروفری خلیج گرگان بر اساس شاخص کارلسون نشان داد که مطالعات در این زمینه بسیار اندک می باشد. محمدخانی و همکاران (۱۳۹۶) در طرحی با عنوان مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان، بر اساس میزان فسفر، سطح تروفری در کل خلیج را وضعیت مزوتروف و بر اساس اندازه حداکثر عمق دید در محدوده اکوسیستم‌های اوتروف گزارش کرد. عقیلی و همکاران (۱۳۹۷) نیز براساس میزان فسفر کل، سطح تروفری در کل خلیج را وضعیت مزوتروف و براساس میزان نیتروژن کل، سطح تروفری در کل خلیج را وضعیت مزوتروف متمایل به اوتروف گزارش کرد و در رابطه با شاخص کارلسون بر اساس کلروفیل-آ برای خلیج تاکنون گزارشی منتشر نشده است.

در شرایط فعلی و وجود مشکل کم آبی به دلیل کمبود بارندگی و خشکسالی در کشور (موسوی، ۱۳۸۸؛ Dastdaran et al., 2017) حفظ و مدیریت منابع آبی - از جمله خلیج‌ها- یک ضرورت است. اطلاع از وضعیت کیفی آب‌ها این امکان را فراهم می‌سازد تا ضمن استفاده از آن، شیوه‌هایی اتخاذ شود تا کم‌ترین آسیب به این منبع وارد شود. خلیج گرگان تنها خلیج دریای خزر می باشد که در شمال ایران واقع شده است. آب این خلیج قابلیت شرب ندارد اما منطقه میانکاله که بخش غربی خلیج می باشد، مکان زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجریست که در فصل زمستان از روسیه به این مکان مهاجرت می کنند. به



شکل ۱: تصویر موقعیت نقاط نمونه برداری

Figure 1: Images of the location of the Site Sampling

جدول ۱: محدوده‌های شاخص وضعیت تروفی (Carlson, ۱۹۷۷)

Table 1: Classification of Carlson's trophic state index (Carlson, 1977)

مقادیر شاخص TSI	وضعیت تروفی	مقادیر شاخص TSI	وضعیت تروفی
۵۱-۷۰	اوتروف	<۴۰	الیگوتروف
>۷۰	هایپر تروف	۴۱-۵۰	مزوتروف

صفحه سکشی از رابطه ۳، مدل تروفی برای ازت کل از رابطه ۴ و برای محاسبه تروفی کل از رابطه ۵، استفاده می‌گردد (Carlson, 1977):

مقیاس CTSI به صفر تا ۱۰۰ تقسیم می‌شود. در این شاخص، وضعیت تروفی برای فسفات کل از رابطه ۱، مدل تروفی برای کلروفیل-آ از رابطه ۲، مدل تروفی برای عمق

$$\text{TSI(P)} = 14/42 \ln[\text{TP}] + 4/15 \quad (\text{رابطه ۱})$$

$$\text{TSI(Chla)} = 30/6 + 9/81 \ln [\text{Chl-a}] \quad (\text{رابطه ۲})$$

$$\text{TSI(SD)} = 60 - 14/41 \times \ln [\text{SD}] \quad (\text{رابطه ۳})$$

$$\text{TSI(N)} = 54/54 + 14/43 \ln(\text{TN}) \quad (\text{رابطه ۴})$$

$$\text{TSI} = [\text{TSI(P)} + \text{TSI(Chl-a)} + \text{TSI(SD)}]/3 \quad (\text{رابطه ۵})$$

SD = عمق شفافیت به متر CHL_a = غلظت کلروفیل-آ به میکروگرم بر لیتر

TP = فسفر کل به میکروگرم بر لیتر TN = نیتروژن کل به میکروگرم بر لیتر

نتایج

فاکتورهای محیطی

مقادیر اندازه‌گیری شده فاکتورها برای کل سال و به تفکیک فصل در جدول ۲ ارائه شده است. براساس جدول، تنها دو فاکتور عمق و شفافیت اختلاف معنی‌داری در چهار فصل نشان ندادند و سایر فاکتورها دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P < 0.05$).

جهت ترسیم نقشه‌ها از روش IDW در محیط نرم‌افزار GIS استفاده شد. این روش یکی از ساده‌ترین روش‌های درون‌یابی است و به پیش نیازهای کمتری نیاز دارد و روشی عمومی و رایج می‌باشد. قبل از انجام آنالیز استانداردسازی داده‌ها انجام و هم خطی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بررسی گردید. جهت آنالیز نتایج و محاسبه شاخص از نرم‌افزار اکسل ۲۰۱۰ و ۳.۶.۲ R، جهت استخراج نقشه‌ها از GIS 10.2 و گوگل ارث استفاده شد.

جدول ۲: مقادیر میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب (کل سال)

Table 2: The average values of the physical and chemical parameters of water (year)

واحد	کمترین	بیشترین	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	کل سال
کلروفیل-آ	۱/۱۰	۳۲/۲۰	۱۲/۰۱±۶/۷۳ ^a	۱۲/۹۳±۸/۰۵ ^a	۱۲/۶۴±۶/۸۳ ^a	۴/۴۴±۳/۱۸ ^b	۱۰/۵۰±۷/۲۷
عمق	۴۵/۰۰	۳۱۰/۰۰	۱۵۴/۶۱±۷۵/۴۱ ^a	۱۴۰/۲۲±۶۷/۹۸ ^a	۱۴۷/۰۹±۷۶/۷۸ ^a	۱۶۵/۹۶±۷۳/۴۶ ^a	۱۵۱/۹۷±۷۲/۹۰
شفافیت	۱۵/۰۰	۲۵۰/۰۰	۸۷/۵۷±۳۸/۷۵ ^a	۱۰۷±۵۶/۰۵ ^a	۱۱۰±۵۷/۰۶ ^a	۹۹/۴۸±۳۳/۸۴ ^a	۱۰۱/۸۲±۴۸/۱۵
نیترات	۰/۰۱۹	۴/۳۵۰	۰/۴۴۰±۰/۲۷۰ ^c	۱/۹۸±۰/۵۶۰ ^b	۲/۵۴۰±۰/۶۴۰ ^a	۰/۰۹۰±۰/۰۴۰ ^d	۱/۲۶۰±۱/۱۲۰
فسفات	۰/۰۰۰	۰/۶۱۰	۰/۰۰۷±۰/۰۰۷ ^b	۰/۰۰۷±۰/۱۱۰ ^a	۰/۰۳۸±۰/۰۱۷ ^b	۰/۰۱۷±۰/۰۲۳ ^b	۰/۰۴۲±۰/۰۶۰
نیتريت	۰/۰۰۴	۰/۷۱۹	۰/۰۱۳±۰/۰۰۷ ^a	۰/۰۰۷±۰/۰۲۰ ^{ab}	۰/۲۸۲±۰/۱۴۰ ^a	۰/۰۴۵±۰/۰۳۲ ^b	۰/۱۰۴±۰/۱۲۰

شاخص کارلسون (CTSI)

Carlson (۱۹۷۷) پیشنهاد کرد از آن‌جایی که کلروفیل برآوردکننده مستقیم وزن جلبک است، از آن به عنوان فاکتور اولیه شاخص استفاده شود. عمق سکشی‌دیسک و فسفر کل فقط در صورت در دسترس نبودن مقادیر کلروفیل، باید برای تعیین حالت تروفیک استفاده شود. در این بررسی، شاخص کارلسون بر مبنای کلروفیل-آ، عمق

سکشی‌دیسک و فسفر کل محاسبه شد اما میزان شاخص بر مبنای کلروفیل-آ جهت بررسی نهایی استفاده شد. از لحاظ شرایط تروفي بر اساس میزان غلظت کلروفیل-آ با استفاده از شاخص کارلسون، خلیج در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان در طبقه اوتروف و در فصل بهار در طبقه مزوتروف قرار دارد (جدول ۳).

جدول ۳: طبقه‌بندی نهایی شاخص کارلسون برای خلیج گرگان در فصول مختلف (کارلسون، ۱۹۷۷)

Table 3: Final classification of the Carlson index for the Gorgan bay in different seasons (Carlson, 1977)


فصل	TSI(CHLa)	طبقه بندی	TSI (SD)	طبقه بندی	TSI (TP)	طبقه بندی	TSI (TP) + TSI (CHLa) + TSI (SD) ۳/	طبقه بندی
تابستان	۵۳/۴۸	اوتروف	۶۳/۳۳	اوتروف	۲۶/۷۵	الیگوتروف	۴۷/۸۶	مزوتروف
پاییز	۵۳/۶۹	اوتروف	۶۱/۶۱	اوتروف	۶۹/۲۲	اوتروف	۶۱/۵۱	اوتروف
زمستان	۵۳/۶۷	اوتروف	۶۰/۹۳	اوتروف	۵۵/۱۷	اوتروف	۵۶/۵۹	اوتروف
بهار	۴۲/۷۵	مزوتروف	۶۱/۵۸	اوتروف	۳۵/۳۰	الیگوتروف	۴۶/۵۵	مزوتروف

شکل ۲، نقشه‌های شاخص کارلسون بر اساس کلروفیل-آ می‌باشد که نشان می‌دهند که تقریباً تمام خلیج در

وضعیت اوتروف قرار دارد. در تابستان و پاییز نواحی شرقی و مرکزی خلیج پرتولیدتر از نواحی غربی می‌باشند

درحالی که در فصل زمستان وضعیت عکس می باشد. در بهار نواحی عمیق مرکزی و بخش دهانه خلیج پرتولیدتر از

سایر قسمت ها می باشد.



شکل ۲: نقشه های درون یابی شاخص کارلسون بر مبنای کلروفیل-آ در فصول مختلف در خلیج گرگان

Fig 2: Figure 2: Carlson index interpolation maps based on chlorophyll-a in different seasons in the Gorgan Bay

بحث

اوتروفیکاسیون یکی از مشکلات عمده دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها در سراسر جهان می باشد (Mirzajani *et al.*, 2010). منابع آبی کم عمق نظیر تالاب ها و خلیج ها در مقایسه با منابع آبی عمیق تر در اثر ورود مواد مغذی از حوضه های آبریز اطراف سریع تر در معرض تغییرات اکولوژیک قرار می گیرند و آسیب پذیرترند (Nouri *et al.*, 2010). وضعیت تروفیک منابع آبی معمولاً از طریق فاکتورهای زیستی (کلروفیل-آ) و غیر زیستی (نیترات و فسفات و عمق) اندازه گیری می شوند (Sass *et al.*, 2007). بررسی مقادیر شاخص کارلسون بر حسب کلروفیل-آ نشان داد که خلیج گرگان در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان در وضعیت اوتروف و در فصل

بهار در وضعیت مزوتروف قرار دارد. در مطالعه حاضر بر اساس میزان فسفات، در فصل های پاییز و زمستان اوتروف و در فصل های تابستان و بهار در وضعیت اولیگوتروف قرار دارد و بر اساس شفافیت در هر چهار فصل در وضعیت اوتروف قرار دارد. عقیلی و همکاران (۱۳۹۷) سطح تروپی در کل خلیج را براساس میزان فسفرکل، وضعیت مزوتروف و بر اساس میزان نیتروژن کل، وضعیت را مزوتروف متمایل به اوتروف گزارش کرد. محمدخانی و همکاران (۱۳۹۶) بر اساس میزان فسفر، سطح تروپی در کل خلیج گرگان را، مزوتروف و بر اساس اندازه حداکثر عمق دید، اوتروف گزارش کرد. Carlson (۱۹۷۷) پیشنهاد کرد، از آنجایی که کلروفیل برآوردکننده مستقیم وزن جلبک است، از آن به عنوان فاکتور اولیه شاخص استفاده شود.

در طول سال میسر است. در مطالعات پیشین بر اساس فاکتورهای غیرزیستی یوتروف بودن خلیج گرگان گزارش شد در حالی که تاکنون گزارشی مبنی بر درجه اوتروپی خلیج بر اساس فاکتورهای زیستی گزارش نشده بود و مطالعات حاضر نشان داد خلیج از نظر فاکتور زیستی نیز، ناحیه اوتروف محسوب می‌شود. به طور کلی، نتایج این مطالعه و مطالعات پیشین نشان می‌دهد که خلیج در مرحله اوتروف قرار گرفته و اقدامات اساسی برای کاهش ورود مواد مغذی ناشی از تخلیه فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی به خلیج گرگان برای حفاظت از آن ضروری است. همچنین پیشنهاد می‌شود این مطالعات به صورت متوالی (دوره‌های حداقل یک‌ساله) انجام شود تا اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری جهت اقدامات آینده در اختیار محققان، افراد و سازمان‌های ذی‌ربط در دسترس قرار گیرد.

تشکر و قدر دانی

از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به جهت تأمین مالی، شرکت مادر تخصصی ماهیان خاویاری استان گلستان و اداره کل محیط زیست استان گلستان به جهت تأمین تجهیزات و ادوات نمونه برداری تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

منابع

استاندارد ملی ایران، شماره ۵-۵۷۱۱-۱۳۸۱. آب-واژه نامه-بخش پنجم-شیمیایی و آمار. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ۵۲ ص.
<http://standard.isiri.gov.ir>
 جباری، ح. و منتصری، م.، ۱۳۹۹. بررسی شرایط تروپی تالاب کانی برازان مهاباد با استفاده از فسفر زیست فراهم رسوبات و شاخص کارلسون. تحقیقات کاربردی خاک، ۸(۱): ۱۳۶-۱۴۸.
 جوانی، ع.، شهرآیینی، ح. ط.، محمدخانی، ح.، منصوری، ب. و طبری، ا. ح.، ۱۳۹۳. تغییرات زمانی- مکانی غلظت نیترات و فسفات در خلیج گرگان. علوم و مهندسی محیط زیست، ۱(۳): ۱-۱۳.

عمق سکشی‌دیسک و فسفر کل و نیتروژن کل فقط در صورت در دسترس نبودن مقادیر کلروفیل، باید برای تعیین حالت تروفیک استفاده شود (Carlson, 1977). در رابطه با شاخص کارلسون بر اساس کلروفیل-آ برای خلیج تاکنون گزارشی منتشر نشده است، اما با توجه به گزارش‌های حاضر و قبلی، موضوعی که مسلم است این است که خلیج در محدوده مزوتروف به اوتروف می‌باشد و کنترل و مدیریت دقیق‌تر و بیشتر این اکوسیستم با ارزش ضروری است. کلروفیل بیشتر مربوط به فیتوپلانکتون‌های بیشتر و حالت اوتروفیک بیشتر دریاچه است. Hosmani (۲۰۱۰) عقیده دارد که اندازه‌گیری کلروفیل می‌تواند به عنوان یک شاخص اصلی برای طبقه بندی حالت تروفیک و استنباط عملکرد دریاچه استفاده شود. بیشترین میزان کلروفیل-آ در فصول تابستان تا زمستان ثبت شد که می‌تواند به دلیل افزایش دمای آب در فصل تابستان و به تبع آن افزایش گروه‌های غالب فیتوپلانکتونی باشد. در سایر مطالعات نیز بیان شده است که غلظت کلروفیل-آ در حوزه جنوبی خزر با افزایش درجه حرارت سطح آب به حداکثر خود می‌رسد (Nezlin, 2005). تغییرات غلظت کلروفیل-آ در پاییز و زمستان نیز با تغییرات درجه حرارت سطحی آب هماهنگ می‌باشد. درجه حرارت کمتر دلالت بر تشدید اختلاط آب‌های زیرین بر اثر وزش باد دارد که سبب افزایش ورود مواد مغذی به لایه‌های فوقانی و سبب افزایش نرخ رشد فیتوپلانکتون و زیتوده فیتوپلانکتون می‌شود که مطابق با مطالعات Nezlin (۲۰۰۵) می‌باشد. میزان نیم میکروگرم در لیتر غلظت کلروفیل به عنوان حد مرز یوتریفیکیشن در محیط‌های دریایی محسوب می‌شود (Shahrban and Etemad Shahid, 2010). ورود بیش از حد مواد مغذی از طریق فعالیت‌های انسانی می‌تواند به میزان قابل توجهی سرعت روند طبیعی را تغییر داده و باعث افزایش شود. با توجه به خصوصیات خلیج گرگان از جمله ورود فاضلاب‌های شهری کشاورزی و صنعتی، عمق بسیار کم، مصون بودن از امواج شدید، چرخه اکولوژیک پیچیده‌تر و ترکیب گونه‌ای خاص (جوانی و همکاران، ۱۳۹۳؛ محمدخانی و همکاران، ۱۳۹۶؛ عقیلی و همکاران، ۱۳۹۷؛ Karbassi and Amirnezhad, 2004؛ Sharbaty et al., 2010)، مشاهده میزان بالای کلروفیل

- رحمتی، ر.، پورغلام، ر. و دوستدار، م.، ۱۳۹۱. وضعیت تروفی بر اساس شاخص کارلسون در آب بندان طبیعی مرزن آباد بابل. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ۶(۳): ۱۴-۲۴.
- شیخستانی، ن.، ۱۳۸۰. تبیین شاخص‌های کیفی آب‌های سطحی و کاربرد آن در ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی و پهنه‌بندی رودخانه‌ها. پایان نامه‌ی کارشناسی‌ارشد. دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران. ۲۳۶ ص
- طاهری تیزرو، ع. و قشقای، م.، ۱۳۹۵. تعیین وضعیت تغذیه گرای دریاچه سد اکباتان با استفاده از شاخص کارلسون. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، ۶(۲۳): ۹۲-۱۰۲.
- عابدینی، ع.، باقری، س.، میرزاجانی، ع.ر.، قانع، ا. و طلاکش، م.ر.، ۱۴۰۰. رند تغییرات شاخص تغذیه گرای (TSI) دریاچه چیتگر طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۸. نشریه علمی اکوبیولوژی تالاب، ۱۳(۴۷): ۹۱-۱۰۴.
- عقیلی، ک.، آقایی‌مقدم، ع. و عقیلی، س.م.، ۱۳۹۷. مطالعه سطح تروفیکی خلیج گرگان. مجله آبریان دریای خزر، ۳(۱): ۵۵-۶۲.
- فلاح، م.، پیرعلی زفره‌ئی، ا.ر. و ابراهیمی درجه، ع.، ۱۳۹۷. ارزیابی وضعیت تروفی تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص کارلسون (TSI). مجله پژوهش آب ایران، ۲۸: ۲۱-۲۹.
- محمدخانی، ح.، مظاهری کوهستانی، ز. و قربانی، ر.، ۱۳۹۶. بررسی ترکیب و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های خلیج گرگان-محدوده‌ی استان گلستان. مجله بوم‌شناسی آبریان، ۷(۱): ۱۱۵-۳۹.
- مخلوق، آ.، نصراله زاده ساروی، ح.، پرافکنده، ف.، فضلی، ح.، میرزایی، ر.، حسین پور، ح.، کیهان ثانی، ع.ر. و دوستدار، م.، ۱۳۹۴. پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه‌گرایی دریاچه سد آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی‌شدگی کارلسون. مجله علمی شیلات ایران، ۲۶(۲): ۶۹-۷۹.
- موسوی، غ.، ۱۳۸۸. مهندسی آب (جلد اول). انتشارات حفیظ تهران، چاپ دوم. ۳۸۲ صفحه.
- ویسی، ک.، سمرقندی، م.ر. و نورمرادی، ح.، ۱۳۹۳. پایش پدیده تغذیه‌گرایی در دریاچه سد مخزنی اکباتان با بهره‌گیری از شاخص غنی‌شدگی کارلسون. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۲: ۴۲-۵۰.
- APHA (American Public Health Association), 2000.** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, Washington. 20th Edition. 2462p.
- APHA (American Public Health Association), 2005.** Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. Washington DC, USA. 424 p.
- Bukata, R.P., 2005.** Satellite Monitoring of Inland and Coastal Water Quality: Retrospection, Introspection, Future Directions. CRC Press, Ontario, 272 Pages.
- Carlson, R.E. 1977.** A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22: 361-369. DOI:10.4319/lo.1977.22.2.0361
- Cloern, J.E., Foster, S.Q. and Kleckner, A.E., 2014.** Phyto-plankton primary production in the world's estuarine-coastal ecosystem. *Biogeosciences*, 11: 2477-2501. DOI: 10.5194/bg-11-2477-2014.
- Coelho, S., Gamito, S. and Perez-Ruzafa, A., 2007.** Trophic state of Foz de Almargem coastal lagoon (Algarve, South Portugal) based on the water quality and the phytoplankton community. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 71: 218-231. DOI:10.1016/j.ecss.2006.07.017.

- Dastdaran, M., Morovvati, H., Arasteh, A.M., Azad, M.T. and Lary, K., 2017.** A Comprehensive Model Hydrodynamic and Sediment in The Gorgan Bay. *World Journal of Environmental Biosciences*, 6: 50-55. <https://environmentaljournal.org/storage/models/article/xYpFTtWpwucEfXsEhpfjIC9tXILFXU9e57UyGPahtWkCedjcQyRLqMPVLhAi/a-comprehensive-model-hydrodynamic-and-sediment-in-the-gorgan-bay.pdf>
- Field, C.B., Behrenfeld, M.J., Randerson, J.T. and Falkowski, P., 1998.** Primary production of the bio-sphere: integrating terrestrial and oceanic components. *Science*, 281(5374):237-240. DOI: 10.1126/science.281.5374.237.
- Hosmani, S.P., 2010.** Trophic State Index in Conservation of lake Ecosystems. *Advances in Plant Sciences*, 3, 593-596. DOI: 10.4329/131568500
- Jackson, J.B.C., Kirby, M.X., Berger, W.H., Bjorndal, K.A., Botsford, L.W., Bourque, B.J., Bradbury, R.H., Cooke, R., Erlandson, J., Estes, J.A., Hughes, T.P., Kidwell, S., Lange, C.B., Lenihan, H.S., Pandolfi, J.M., Peterson, C.K., Steneck, R.S., Tegner, M.J. and Warner, R.R., 2001.** Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. *Science*. 293:629-638. DOI: DOI: 10.1126/science.1059199
- Jorgensen, S.E., 2003.** The application of models to find the relevance of residence time in lake and reservoir management. *Journal of Limnology*, 62: 16-20. DOI:10.4081/jlimnol.2003.s1.16
- Kalytite, D., 2007.** Summer phytoplankton in deep Lithuanian lakes, *Ekologica*. 53(4): 52-58. DOI: 10.1126/EK5374.237
- Karbassi, A.R. and Amirnezhad, R., 2004.** Geochemistry of heavy metals and sedimentation rate in a bay adjacent to the Caspian Sea, *International Journal of Environmental Science and Technology*, 1(3):191-198. DOI:10.1007/BF03325832
- Khan, F.A. and Ansari, A.A., 2005.** Eutrophication: an ecological vision. *The Botanical Review*, 71(4): 449-482. <http://www.jstor.org/stable/4354503>
- Loreau, M., Naeem, S., Inchausti, P., Bengtsson, J., Grime, J.P., Hector, A., Hooper, D.U., Huston, M.A., Raffaelli, D.G., Schmid, B., Tilman, D. and Wardle, D.A., 2001.** Biodiversity and ecosystem functioning: *Current Knowledge Future Challenges Science*, 294: 804-808. DOI: 10.1126/science.1064088.
- Mirzajani, A.R., Khodaparast Sharifi, H., Babaei, H., Abedini, A. and Dadai Ghandi, A., 2010.** Eutrophication trend of Anzali wetland based on 1992-2002 data. *Journal of Environmental Studies*, 35(52): 19-21. DOI: 20.1001.1.10258620.1388.35.52.7.1
- Moncheva, S., Dontcheva, V., Shtereva, G., Kamburska, L., Malej, A. and Gorinstein, S. 2002.** Application of eutrophication indices for assessment of the Bulgarian Black Sea coastal ecosystem ecological quality. *Water Science and Technology*, 46(8): 19-28. DOI: 12420962
- Nezlin, P., 2005.** Patterns of seasonal and interannual variability of remotely sensed

- chlorophyll. Springer, Berlin, Heidelberg, 157 p.
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/698_5_007.pdf
- Nixon, S.W., 1995.** Coastal marine eutrophication: a definition, social causes, and future concerns. *Ophelia*, 41: 199–219. DOI: 10.1080/00785236.1995.10422044
- Nixon, S.W., 2009.** Eutrophication and the macroscope. *Hydrobiologia*, 629: 5-19. DOI: 10.1007/s10750-009-9759-z.
- Nouri, J., Mirbagheri, S.A., Farrokhian, F., Jaafarzadeh, N. and Alesheikh, A.A., 2010.** Water quality variability and eutrophic state in wet and dry years in wetlands of the semiarid and arid regions. *Environment and Earth Science*, 59: 1397-1407. DOI: 10.1007/s12665-009-0126-1
- Sass, G.Z., Creed, I.F., Bayley, S.E. and Devito, K.J., 2007.** Understanding variation in trophic status of lakes on the Boreal plain: A 20 year retrospective using Landsat TM imagery. *Remote Sensing of Environment*, 109: 127-141. DOI:10.1016/j.rse.2006.12.010
- Shahrban, M. and Etemad-Shahidi, A., 2010.** Classification of the Caspian Sea coastal waters based on trophic index and numerical analysis. *Environment Monitoring and Assessment*. 164(1):349-356. DOI: 10.1007/s10661-009-0897-6
- Sharbaty, S., Imanpour, M.R. Gorgin S. and Hosseini, S., 2010.** The first phase of simulation studies of short-term sea currents in the Gorgan Bay, Research Report, *Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources*. 71p.
https://www.researchgate.net/publication/338372267_3-D_Simulation_of_Wind-Induced_Currents_Using_MIKE_3_HS_Model_in_the_Caspian_Sea
- Smith, V.H., 2007.** Microbial diversity-productivity relationships in aquatic ecosystems. *FEMS Microbial Ecology*. 62:181-186. DOI: 10.1111/j.1574-6941.2007.00381.x
- Tusseau-Vuillemin, M.H., 2001.** Do food processing industries contribute to the eutrophication of aquatic systems? *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 50(2):143-152. DOI: 10.1006/eesa.2001.2083.

Evaluation of the Gorgan Bay trophy status with Carlson index (CTSI)

Maleki P.¹; Patimar R.^{1*}; Jafariyan H.¹; Salmanmahiny A.²; Ghorbani R.²; Gholizadeh M.¹; Harsij M.¹

1-Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Iran

2-Department of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

*rpatimar@yahoo.com

Abstract

Over the past years, eutrophication due to human activities has been recognized as a major ecological problem for the coastal areas, which in turn leads to significant changes in physico-chemical and biological factors. The aim of the present study was to determine the eutrophication status of the Gorgan Bay, which was evaluated using the Carlson index as one of the efficient methods for assessing the eutrophication status of water bodies. The Gorgan Bay is located in the southeast of the Caspian Sea. The sampling was carried out in 23 stations with three replications seasonally from summer 2018 to spring 2019. Nitrate, phosphate, chlorophyll α , depth, and transparency were measured in each sample. Carlson's index in terms of chlorophyll α showed that the bay is in the eutrophic status in three seasons including summer, autumn, and winter (with the numbers 53.48, 53.69, and 53.67, respectively), and the mesotrophic status in spring (with the number 42.75). In terms of phosphate concentration, the bay was eutrophic in autumn and winter, and in summer (69.22 and 55.17) and oligotroph in spring (26.75 and 35.30), while in terms of transparency the bay was categorized as eutrophic in all seasons (63.33, 61.61, 69.93 and 61.58, respectively). In general, the results showed that the bay is in the range of mesotrophic to eutrophic status and therefore, more conservation management of this unique ecosystem is essential.

Keywords: Gorgan Bay, Trophy, Carlson's index, Chlorophyll- α , Depth, Nitrate, Phosphate

*Corresponding author