



مقاله علمی - پژوهشی:

تغییرات مکانی و زمانی ماهیان در اجتماعات مرجانی (جزیره هنگام، خلیج فارس)

سیامک بهزادی^{*}، علی سالارپوری^۱، رضا دهقانی^۱، غلامعلی اکبرزاده^۱، محسن گذری^۱، حمیدرضا اسماعیلی^۲

*behzadi@pgoseri.ac.ir

۱- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات

آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

۲- بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

تاریخ پذیرش: دی ۱۴۰۱

تاریخ دریافت: مرداد ۱۴۰۱

چکیده

در این پژوهش فراوانی ماهیان مرجانی جزیره هنگام به روش مشاهده مستقیم و ترانسکت کمربندی شکل، به صورت فصلی از تابستان ۱۳۹۹ لغایت بهار ۱۴۰۰ مطالعه شدند. در مجموع، ۳۸ گونه در پنج ایستگاه انتخابی شناسایی شدند که ۳۱ گونه از ماهیان گیاه‌خوار بوده و خانواده‌های Pomacentridae و Labridae با ۷ و ۴ گونه دارای بیشترین فراوانی بودند. بیشترین فراوانی ماهیان گیاه‌خوار *Thalassoma lunare*، در ایستگاه دو (71 ± 80)، عدد بر کیلومتر مربع تخمین زده شد. به‌علاوه، دو گونه از طوطی‌ماهیان (*Scarus ghobban* و *Scarus persicus*)، دارای بیشترین حضور در تمامی ایستگاه‌ها بودند. بیشترین متوسط فراوانی فصلی ماهیان گیاه‌خوار در ایستگاه ۲ در زمستان (12 ± 58) عدد بر کیلومتر مربع و کمینه در ایستگاه ۳ در تابستان (۲۱ ± 5)، عدد بر کیلومتر مربع ثبت شد. به‌جز فصل تابستان که فراوانی ماهیان گیاه‌خوار بین ایستگاه‌ها اختلاف معنی‌داری نداشتند، سایر فصل‌ها با یکدیگر متفاوت بودند ($p < 0.05$). تغییرات زمانی و مکانی فراوانی ماهیان گیاه‌خوار در ایستگاه‌ها بیانگر اهمیت عملکرد انتخابی ماهیان در تعیین آشیانه اکولوژیک مجزاست. لذا، نقش افزونگری عملکردی بیشتر از نقش مکمل عملکردی در بین این ماهیان در آینده زیستی جوامع مرجانی این جزیره می‌تواند مؤثر باشد. از این‌رو، توصیه می‌شود از ذخیره ماهیان مرجانی جزیره هنگام محافظت شود.

لغات کلیدی: ماهیان مرجانی، فراوانی، عملکرد، جزیره هنگام، خلیج فارس

^{*}نویسنده مسئول

مقدمه

آب‌سنگ‌های مرجانی در دنیا به دلیل فعالیت‌های انسانی متعدد، تغییرات آب و هوایی جهانی، توسعه سواحل، آلودگی‌هایی با منشأ خشکی و دریا، صید بی‌رویه، طوفان‌های استوایی و استرس حرارتی در حال کاهش هستند (Ribas-Deulofeu *et al.*, 2021). طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۹ تقریباً ۱۴ درصد مرجان‌های آب‌سنگ‌های مرجانی در دنیا از بین رفته‌اند (Souter *et al.*, 2021) و تغییر از گونه‌های مرجانی به جلبک‌های بزرگ در اثر کاهش آب‌سنگ‌های مرجانی به صورت یک پدیده غالب در این زیست بوم‌ها درآمده است (Ribas-Deulofeu *et al.*, 2021). رشد جلبک‌های بزرگ می‌تواند مانع نشست، بقاء و رشد مرجان‌ها گردد به‌طوری‌که یک زیست‌بوم مرجانی به‌سختی می‌تواند خود را بازسازی نماید (Dell *et al.*, 2020). پس از تخریب زیست‌بوم‌های مرجانی به دلایل گوناگون، تغییرات فازی در موازنه گونه‌های مرجانی/جلبک‌های درشت در این زیست‌بوم‌ها به فعالیت ناکافی گیاه‌خواران، یوتریفیکیشن، اختلالات محیطی (طوفان، گرم شدن اقیانوس‌ها و سفید شدن مرجان‌ها) یا ترکیبی از این عوامل نسبت داده شده است (Adam *et al.*, 2021). امروزه در سرتاسر دنیا آب‌سنگ‌های مرجانی در خطر تغییر به وضعیت تحت تسلط جلبک‌های غالب در زیست‌بوم‌های تخریب‌شده به علت شرایط اکولوژیک هستند که آنها را در برگرفته است (Munday, 2004). ماهیان گیاه‌خوار نقش مهمی در جلوگیری از فراوانی بیش از حد جلبک‌های بزرگ در آب‌سنگ‌های مرجانی دارند. آگاهی از انتخاب‌پذیری تغذیه و مصرف آنها از گیاهان می‌تواند در مطالعات نقش اکولوژیک آنها در محافظت و بازسازی ذخایر آب‌سنگ‌های مرجانی مؤثر باشد. به‌علاوه، تنوع عملکردی، ماهیان گیاه‌خوار، سلامت آب‌سنگ‌های مرجانی را حفظ می‌کند و مقاومت صخره‌ها را در برابر استرس‌ها افزایش می‌دهد (Adam *et al.*, 2021). گزارش شده است که ماهیان گیاه‌خوار برای حفظ آب‌سنگ‌های مرجانی حیاتی هستند، زیرا جلبک‌ها را مصرف می‌کنند که با مرجان‌ها رقابت می‌نمایند (Ferrier-Pagès *et al.*, 2021). ماهیان گیاه‌خوار شامل چندین گروه عملکردی هستند که از نظر نحوه تغذیه و

آنچه مصرف می‌کنند و تأثیری که بر بستر می‌گذارند، متفاوت هستند (Green and Bellwood, 2009). گونه‌های گیاه‌خوار در این پژوهش به گونه‌هایی اطلاق شده است که در تمام مراحل زندگی یا چرخه‌ای از حیات خود، از این رژیم غذایی برخوردارند و در حال حاضر، در زیست‌بوم مرجانی و صخره‌ای جزیره هنگام، زیست می‌نمایند. در این تحقیق شناسایی و فراوانی جمعیت، برآورد تراکم در واحد سطح ماهیان گیاه‌خوار در زیست‌بوم‌های مرجانی، بررسی ساختار فتوتیپی جمعیتی و مطالعه نقش اکولوژیک آنها در سلامت نگهداشتن آینده زیستی مرجان‌ها برای اولین بار در آب‌های خلیج فارس محدوده جزیره هنگام صورت پذیرفت.

مواد و روش کار

منطقه مورد مطالعه


این پژوهش در ۵ ایستگاه به روش برآورد مستقیم به روش مشاهده زیرآب^۱ (UVCm)، در بازه زمانی تابستان ۱۳۹۹ لغایت بهار ۱۴۰۰، به صورت فصلی با شناور استیجاری متعلق به تعاونی گردشگری جزیره هنگام مجهز به موتور ۴۵ اسب بخار انجام شد. به منظور انتخاب ایستگاه، ابتدا درگشت مقدماتی محدوده پراکنش زیستگاه ماهیان در آب‌های زیر ۵ متر پیرامون جزیره از روش غواصی سطحی^۲ و روش مانتاتو و در اعماق بالاتر از ۵ متر تا آخرین محدوده پراکنش این جوامع (تقریباً ۱۵ متر)، از غواصی با کپسول و UVCm استفاده شد (Willis, 2001; Emslie *et al.*, 2018). اساس این روش آن استوار است که تعداد یک آبی در یک‌زمان ثابت در یک منطقه تعریف‌شده (ترانسکت و یا کوادرات) ثبت می‌گردد (Tebbett *et al.*, 2020). همچنین جهت حفظ وحدت رویه در مطالعات، نام محلی منطقه که قبلاً سایر محققین آنها را انتخاب کرده بود، هم‌زمان با شماره ایستگاه‌ها در جدول ۱ و شکل ۱ ارائه شده است (علی عسگری و همکاران، ۱۳۹۱).

^۱ Underwater Visual Census method^۲ Snorkeling

جدول ۱: ایستگاه‌های نمونه‌برداری ماهیان در آبهای پیرامون جزیره هنگام ۱۴۰۰-۱۳۹۹

Table 1: Fish sampling stations in Hengam Island's water 2020-2021

منطقه	شماره ایستگاه	مساحت (km ²)	عمق (m)	طول جغرافیایی (شرقی)	عرض جغرافیایی (شمالی)	جنس بستر
اسکله	St ₁	۰/۵۵	۲-۱۰	۵۵°۵۳'۵۴"	۲۶°۴۰'۵۷"	۵-۴-۲-۱
عباس	St ₂	۱/۱۸	۵-۱۵	۵۵°۵۴'۱۹"	۲۶°۳۸'۱۷"	۵-۴-۲-۱
خنزی	St ₃	۰/۲۹	۳-۱۲	۵۵°۵۳'۵۱"	۲۶°۳۷'۵۱"	۳-۱
عرب‌ها	St ₄	۰/۱۲	۳-۹	۵۵°۵۲'۲۱"	۲۶°۳۶'۴۰"	۴-۲-۱
قیل	St ₅	۰/۳۸	۲-۱۵	۵۵°۵۰'۵۰"	۲۶°۳۸'۱۵"	۳-۱



شکل ۱: نقشه جزیره هنگام و ایستگاه‌های نمونه‌برداری ۱۴۰۰-۱۳۹۹
Figure 1: Map of Hengam Island and sampling stations, 2020-2021

برآورد تراکم و تعداد در واحد سطح ماهیان

در زیست‌بوم‌های دریایی به‌خصوص صخره‌های مرجانی، به منظور مطالعه جمعیت ماهیان، از دو روش نمونه‌برداری تخریبی و غیر تخریبی استفاده می‌شود (Emslie *et al.*, 2018). روش‌های متعددی جهت استفاده در روش مشاهده مستقیم برآورد ذخایر ماهیان استفاده می‌گردد که با توجه به توپوگرافی بستر مورد مطالعه متفاوت است.

شناسایی ماهیان

به منظور شناسایی ماهیان از تصویربرداری زیرآب و تطبیق با کلیدهای شناسایی معتبر (Fischer and Bianchi, 1984; Smith *et al.*, 2003) و ماهیان گیاه‌خوار با توجه به رژیم غذایی گزارش‌شده برای گونه‌ها در منابع موجود شناسایی شد (Randall and Hoover, 1995).

Labridae ۴ گونه و خانواده‌های Apogonidae، Chaetodontidae و Gobiidae با ۳ گونه قرار داشتند. در جدول ۲، اسامی ماهیان همراه با سطوح غذایی مربوطه ارائه شده است. سطح غذایی، جایگاه بوم‌شناسی یک‌گونه را در شبکه غذایی نشان می‌دهد. این شاخص از عدد ۲ برای گیاه‌خواران و دتریتوس‌خواران^۲ و ۵ برای گوشت‌خواران متغیر است.

بیشترین میانگین ماهیان گیاه‌خوار *Thalassoma lunare*، در ایستگاه دو با $80 \pm (71/24)$ ، عدد بر کیلومتر مربع تخمین زده شد. همچنین دو گونه از طوطی‌ماهیان (*Scarus persicus* و *Scarus ghobban*)، دارای بیشترین حضور در تمامی ایستگاه‌ها بودند (جدول ۳).

ماهیان گیاه‌خوار در ایستگاه‌های دو، چهار، سه، پنج و یک با ۹۰، ۹۰، ۸۸، ۷۷ و ۶۷ درصد فراوانی و ماهیان گوشت‌خوار با ۳۳، ۲۳، ۱۲، ۱۰ و درصد فراوانی در ایستگاه‌های یک، پنج، سه، دو و چهار به‌ترتیب دارای بیشترین مقدار فراوانی بوده‌اند. نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه تست توکی نشان‌دهنده فقدان اختلاف بین فراوانی ماهیان گیاه‌خوار در ایستگاه‌ها و بین ماهیان گوشت‌خوار در سه ایستگاه دو، سه و چهار بوده است ($p > 0.05$)، هرچند نتایج حاصل از همین آزمون در همین سطح احتمال نشان‌دهنده اختلاف بین فراوانی ماهیان گوشت‌خوار در ایستگاه یک با ایستگاه پنج و نیز با سه ایستگاه دیگر است ($p < 0.05$) (جدول ۴).

در این پژوهش از روش ترانسکت کمربندی شکل^۱ که مناسب برای این تحقیق بوده استفاده شد. همچنین به منظور پوشش بهتر اطلاعات، همزمان در هر ایستگاه فیلم‌برداری صورت پذیرفت تا پس از مطالعه و بازبینی فیلم‌ها، اطلاعات جمع‌آوری شده صحت‌سنجی گردد. شایان ذکر است، روش مطالعه در مدت زمان نمونه‌برداری در هر ایستگاه ثابت است و طول و عرض ترانسکت بر اساس شفافیت آب و میزان دید غواص در هر ایستگاه انتخاب گردیده که در هر گشت متغیر بوده است و در فرم‌های نمونه‌برداری ثبت می‌شدند. همچنین اگر گروهی از آبزیان در دسته‌های بزرگ مشاهده شدند، حدود تقریبی آنها ثبت گردید (Samoilys and Carlos, 2000). فراوانی گونه‌ها در هر ایستگاه با استفاده از معادله ۱ به‌دست آمد:

$$N = (\sum N_i) / (\sum A_i) \quad (1)$$

N : تعداد در هر ایستگاه، N_i : تعداد ماهی در ایستگاه i و A_i : مساحت ایستگاه i

سیس تعداد در هر ایستگاه در هر فصل، در مساحت کل ایستگاه ضرب و تعداد در منطقه نمونه‌برداری شده در آن فصل محاسبه شد (Samoilys and Carlos, 2000).

روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

در این تحقیق برای بررسی وضعیت نرمال بودن داده‌ها از آزمون‌های کلموگروف-اسمیرنوف و شفیرو-ویلک استفاده گردید. در صورت نرمال نبودن داده‌ها برای انجام آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه از آزمون‌های ناپارامتریک، کروسکال والیس و به منظور بررسی اختلاف یا عدم اختلاف تعداد گونه‌ها بین ایستگاه‌ها و فصول از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی در نرم‌افزار اس SPSS، نسخه ۱۸ استفاده شد.

نتایج

در این پژوهش ۳۸ گونه از ماهیان شناسایی شد که ۷ گونه از ماهیان گوشت‌خوار و ۳۱ گونه از ماهیان گیاه‌خوار بودند و خانواده Pomacentridae با ۷ گونه بیشترین تعداد گونه‌ها را به‌خود اختصاص دادند. پس از آن، خانواده

² Detritivores

¹ Belt Transect

جدول ۲: اسامی ماهیان به همراه سطوح غذائی در زیست‌بوم‌های مرجانی جزیره هنگام

Table 2: Fish and food levels in the coral ecosystems of Hengam Island

سطح غذایی	نام فارسی گونه	نام علمی گونه	نام فارسی	خانواده	رژیم غذایی
۲	جراح دم زرد	<i>Zebrasoma xanthurum</i>	جراح ماهیان	Acanthuridae	
۲	جراح دم‌قیچی	<i>Acanthurus sohal</i>			
۳/۵	آپاگون ماهی ۱	<i>Cheilodipterus novemstriatus</i>	آپاگون ماهیان	Apogonidae	
۳/۵	آپاگون ماهی ۲	<i>Cheilodipterus quinquelineatus</i>			
۳/۶	آپاگون ماهی ۳	<i>Ostorhinchus cyanosoma</i>			
۳/۵	پیکاسو	<i>Rhinecanthus assasi</i>	ماشه ماهیان	Balistidae	
۲/۶	بلنی خلیج	<i>Ecsenius pulcher</i>	بلنیده ماهیان	Blenniidae	
۳/۴	تفنگچی	<i>Caesio varilineata</i>	تفنگچی ماهیان	Caesionidae	
۳/۳	پروانه زرد	<i>Chaetodon melapterus</i>			
۳/۶	پروانه قهوه‌ای	<i>Chaetodon nigropunctatus</i>	پروانه ماهیان	Chaetodontidae	
۳/۵	پروانه آنتن‌دار	<i>Heniochus acuminatus</i>			
۳/۵	گاوماهی ۱	<i>Valenciennesa sexguttata</i>			
۳/۲	گاوماهی ۲	<i>Gnatholepis anjerensis</i>	گاوماهی	Gobiidae	
۳/۲	گاوماهی ۳	<i>Istigobius ornatus</i>			
۳/۴۶	نئون	<i>Labroides dimidiatus</i>			
۳/۵	زرد دم‌هلالی	<i>Thalassoma lunare</i>	زرد ماهیان	Labridae	گیاه‌خوار
۳/۴	زرد ماهی ۱	<i>Halichoeres dussumieri</i>			
۳/۳	زرد ماهی ۲	<i>Halichoeres marginatus</i>			
۲/۷	هاماد	<i>Pomacanthus maculosus</i>	هاماد ماهیان	Pomacanthidae	
۲/۶	ملوان	<i>Abudefduf vaigiensis</i>			
۳/۴	فرشته ماهی ۱	<i>Chormis weberi</i>			
۳/۱	فرشته ماهی ۲	<i>Chormis xanthopterygia</i>			
۲/۴	فرشته ماهی ۳	<i>Chrysiptera spp.</i>	دوشیزه ماهیان	Pomacanthidae	
۲/۷	فرشته ماهی ۴	<i>Pomacentrus aquilus</i>			
۲/۷	فرشته ماهی ۵	<i>Pomacentrus leptus</i>			
۲/۷	فرشته ماهی ۶	<i>Dascyllus trimaculatus</i>			
۳/۱	جعبه‌ماهی	<i>Ostracion cyanurus (Female)</i>	جعبه ماهیان	Ostraciidae	
۲/۹	طولی ایرانی	<i>Scarus persicus</i>	طوطی ماهیان	Scaridae	
۲	طوطی زرد پولک	<i>Scarus ghobban</i>			
۲/۹	صافی موج	<i>Siganus javus</i>	صافی ماهیان	Siganidae	
۲/۱	کفال	<i>Mugilus sp.</i>	کفال ماهیان	Mugilidae	
۴/۵	گیش بجد	<i>Carangoides bajad</i>	گیش ماهیان	Carangidae	
۳/۷	خنو خاکستری	<i>Diagramma pictum</i>	سنگسر ماهیان	Haemulidae	
۳/۸	سرخوی خال‌سیاه	<i>Lutjanus fluviiflamma</i>	سرخو ماهیان	Lutjanidae	
۳/۹	بز ماهی	<i>Parupeneus sp.</i>	بز ماهیان	Mullidae	گوشت‌خوار
۳/۷	گوازیم خال قهوه‌ای	<i>Scolopsis ghanam</i>	گوازیم ماهیان	Nemipteridae	
۴/۲	هامور زیتونی منقوط	<i>Epinephelus stoliczkae</i>	هامور ماهیان	Serranidae	
۴/۱	هامو سمن آجری	<i>Cephalopholis hemistiktos</i>			

جدول ۳: تعداد (میانگین و انحراف معیار)، ماهیان گیاهخوار در جزیره هنگام

Table 3: Number (mean and standard deviation) of herbivorous fish in Hengam Island

نام علمی	اسکله		عباس		خنزی		عرب‌ها		قیل	
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار
<i>Acanthurus sohal</i>	۲۴	۱۶/۴۶	۲۵	۱۴/۹۷	۱۱	۸/۶۲	۱	۲/۰۰	۲۱	۱۶/۱۹
<i>Zebrasoma xanthurum</i>	۰	۰	۲۳	۱۳/۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Thalassoma lunare</i>	۳۳	۲۵/۴۵	۸۰	۷۱/۲۴	۲۸	۳۲/۷۱	۰	۰	۳۷	۱۰/۲۵
<i>Pomacanthus maculosus</i>	۲۱	۱۴/۰۸	۴۸	۴۹/۶۴	۱۶	۱۲/۲۰	۵	۳/۳۰	۴	۲/۹۴
<i>Heniochus acuminatus</i>	۳۰	۲۴/۳۹	۴۸	۴۹/۹۰	۲۰	۲۰/۷۳	۰	۰	۱۲	۱۰/۵۰
<i>Chaetodon nigropunctatus</i>	۰	۰	۳۹	۲۹/۲۸	۱۵	۱۹/۸۲	۰	۰	۰	۰
<i>Chaetodon melapterus</i>	۰	۰	۱۱	۱۶/۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Abudefduf vaigiensis</i>	۶۹	۳۵/۴۲	۰	۰	۳۵	۱۶/۰۳	۳۵	۸/۳۹	۴۸	۲۸/۸۹
<i>Labroides dimidiatus</i>	۰	۰	۳۳	۲۹/۱۰	۳	۴/۵۷	۰	۰	۰	۰
<i>Chormis weberi</i>	۲۳	۱۶/۴۷	۱۵	۱۴/۷۷	۱۵	۹/۴۰	۲۱	۹/۶۸	۰	۰
<i>Chormis xanthopterygia</i>	۰	۰	۵۱	۳۵/۹۲	۰	۰	۱۸	۴/۰۸	۰	۰
<i>Pomacentrus leptus</i>	۳۳	۳۰/۳۹	۳۲	۲۵/۲۴	۱۶	۱۸/۹۲	۱۰	۶/۶۵	۰	۰
<i>Scarus persicus</i>	۱۳	۱۳/۵۰	۴۵	۴۰/۱۱	۴۴	۴۱/۱۵	۲۶	۹/۶۷	۱۵	۶/۹۵
<i>Scarus ghobban</i>	۵۲	۳۶/۸۵	۴۲	۲۳/۲۵	۶۲	۶۲/۲۳	۲۶	۱۸/۰۰	۱۶	۶/۵۶
<i>Siganus javus</i>	۵	۵/۷۴	۰	۰	۳	۲/۵۰	۰	۰	۴	۳/۷۷
<i>Dascyllus trimaculatus</i>	۲۷	۱۷/۳۲	۰	۰	۲۱	۱۲/۸۳	۰	۰	۷	۳/۴۰
<i>Valenciennaea sexguttata</i>	۰	۰	۰	۰	۱۳	۷/۵۰	۱	۰/۳۰	۰	۰
<i>Caesio varilineata</i>	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۳۶/۱۵	۰	۰	۴	۳/۷۴
<i>Cheilodipterus novemstriatus</i>	۶۰	۳۴/۷۲	۴۱	۲۳/۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Cheilodipterus quinquelineatus</i>	۸۱	۵۴/۱۱	۳۲	۲۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Ostorhinchus cyanosoma</i>	۰	۰	۸	۶/۹۸	۹	۱۰/۲۳	۰	۰	۰	۰
<i>Chrysiptera spp.</i>	۰	۰	۱	۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Pomacentrus aquilus</i>	۰	۰	۱۶	۹/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Ostracion cyanurus</i>	۰	۰	۰	۰	۳	۱/۷۱	۰	۰	۰	۰
<i>Rhinecanthus assasi</i>	۰	۰	۲	۲/۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Mugilius sp.</i>	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۷/۸۰	۰	۰	۰	۰
<i>Halichoeres dussumieri</i>	۰	۰	۶	۴/۲۷	۱۲	۱۸/۸۳	۰	۰	۰	۰
<i>Halichoeres marginatus</i>	۰	۰	۳۶	۳۷/۷۲	۱۱	۸/۲۹	۰	۰	۰	۰
<i>Ecsenius pulcher</i>	۰	۰	۱	۰/۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Gnatholepis anjerensis</i>	۰	۰	۷	۶/۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<i>Istigobius ornatus</i>	۰	۰	۹	۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول ۴: فراوانی (درصد) و میانگین، ماهیان گیاهخوار و گوشتخوار در جزیره هنگام ۱۴۰۰-۱۳۹۹

Table 4: The Frequency(%) and average of herbivorous fish and carnivours fish in Hengam Island

ایستگاه	ماهیان گیاهخوار		ماهیان گوشتخوار	
	میانگین (± انحراف معیار)	فراوانی (درصد)	میانگین (± انحراف معیار)	فراوانی (درصد)
	(عدد بر کیلومتر مربع)		(عدد بر کیلومتر مربع)	
St ₁	۲/۰۹ (±۳/۲۵) ^a	۶۷	۵/۴۹ (±۱۲/۱۸) ^a	۳۳
St ₂	۳ (±۲/۸۳) ^a	۹۰	۱/۶۰ (±۲/۳۴) ^b	۱۰
St ₃	۲/۷۴ (±۳/۶۹) ^a	۸۸	۲۲/۰۳ (±۳/۱۴) ^b	۱۲
St ₄	۲/۸۳ (±۶/۰۶) ^a	۹۰	۱/۵۹ (±۳/۱۳) ^b	۱۰
St ₅	۲/۴۰ (±۵/۱۶) ^a	۷۷	۳/۸۷ (±۷/۵۹) ^c	۲۳

حروف متفاوت در ستون میانگین‌ها نشانه معنی‌دار بودن اختلاف‌هاست (p<۰/۰۵).

به علاوه، بیشترین فراوانی ماهیان گیاهخوار در بین فصول در زمستان ۱۳۹۹، در ایستگاه دو با میانگین $58(\pm 12/22)$ عدد بر کیلومترمربع و کمینه در فصل تابستان ۱۳۹۹، در ایستگاه سه با میانگین $5(\pm 21/3)$ عدد بر کیلومترمربع نتیجه گیری شد. نتایج حاصل از آزمون آماری فقدان تفاوت را در تعداد ماهیان گیاهخوار در فصل تابستان بین ایستگاه ها و در فصل پاییز و زمستان

بین ایستگاه های یک و دو و ایستگاه های چهار و پنج و در فصل بهار بین ایستگاه یک و سه و ایستگاه دو و پنج نشان داد ($p > 0/05$)، این در حالی است که در فصول پاییز و زمستان بین ایستگاه سه با سایر ایستگاه ها و در فصل بهار بین ایستگاه های دو و چهار با سایر ایستگاه ها اختلاف معنی داری بین تعداد ماهیان در ایستگاه ها نتیجه گیری شد ($p < 0/05$) (جدول ۵).

جدول ۵: تغییرات فصلی (میانگین و انحراف معیار) (عدد بر کیلومترمربع)، ماهیان گیاهخوار ۱۴۰۰-۱۳۹۹

Table 5: Seasonal changes of herbivorous fish (Mean $\pm$ (SD)) N/km², 2020-2021

ایستگاه	تابستان ۱۳۹۹	پاییز ۱۳۹۹	زمستان ۱۳۹۹	بهار ۱۴۰۰
St ₁	$6(\pm 2/25)^a$	$52(\pm 19/25)^a$	$50(\pm 29/25)^a$	$32(\pm 12/83)^a$
St ₂	$7(\pm 3/21)^a$	$40(\pm 18/83)^a$	$58(\pm 22/12)^a$	$20(\pm 10/81)^b$
St ₃	$5(\pm 3/21)^a$	$12(\pm 5/69)^b$	$29(\pm 20/02)^b$	$32(\pm 10/65)^a$
St ₄	$7(\pm 4/18)^a$	$20(\pm 6/06)^c$	$19(\pm 10/02)^c$	$16(\pm 12/15)^c$
St ₅	$6(\pm 4/10)^a$	$17(\pm 4/32)^c$	$20(\pm 9/01)^c$	$23(\pm 5/71)^b$

بحث

در این پژوهش ۳۱ گونه از ماهیان مرجانی گیاهخوار شناسایی شد. در جزیره کیش ۹۹ گونه (Hosseinzadeh, 2000)، در زیستگاه های مصنوعی ۳۹ گونه (بهزادی و همکاران، ۱۳۹۸) و در جزیره لارک ۴۸ گونه از ماهیان مرجانی گیاهخوار و گوشتخوار گزارش شد که ایستگاه هایی که دارای بیشترین تنوع در جنس بستر بودند، بیشترین فراوانی از دو گروه ماهیان گیاهخوار و گوشتخوار را نیز به خود اختصاص دادند. در مطالعه ماهیان مرجانی جزیره لارک نتیجه گیری شد که پوشش کف و ترکیب آبسنگ های مرجانی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جوامع ماهیان صخره ای تأثیرگذار باشد (Messmer et al., 2011). نتیجه گیری شده است بسیاری از گونه ها به طور مستقیم برای غذا و پناهگاه به آنها وابسته هستند (Coker et al., 2014). در مطالعه زمانی گونه ها بیشتر بودن فراوانی ماهیان در فصل زمستان نسبت به سایر فصول می تواند متأثر از مهاجرت های فصلی ماهیان در فصول گرم به آب های عمیق تر در اثر استرس های دمای در زیست بوم های مرجانی و صخره ای در مناطق گرمسیری باشد (McConnell and Lowe-McConnell, 1987). نتایج حاصل از مطالعه تعداد ماهیان بیشترین میانگین ماهیان گیاهخوار *Thalassoma lunare*، در ایستگاه دو با $80(\pm 71/24)$ عدد بر کیلومترمربع تخمین زده شد. اما دو گونه از طوطی ماهیان *S. persicus* و *Scarus*

منطقه بسته تر باشد که در بررسی ذخایر ماهیان جزیره ابوموسی نیز گزارش شده است (بهزادی و همکاران، ۱۳۷۶). اما عکس دو عامل مذکور برای دو ایستگاه چهار و پنج می تواند در نظر گرفته شود که در منطقه بازتری نسبت به امواج قرار دارند. پوشش کف و ترکیب آبسنگ های مرجانی نیز از دیگر عوامل مهمی است که می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جوامع ماهیان صخره ای تأثیرگذار باشد (Messmer et al., 2011). نتیجه گیری شده است بسیاری از گونه ها به طور مستقیم برای غذا و پناهگاه به آنها وابسته هستند (Coker et al., 2014). در مطالعه زمانی گونه ها بیشتر بودن فراوانی ماهیان در فصل زمستان نسبت به سایر فصول می تواند متأثر از مهاجرت های فصلی ماهیان در فصول گرم به آب های عمیق تر در اثر استرس های دمای در زیست بوم های مرجانی و صخره ای در مناطق گرمسیری باشد (McConnell and Lowe-McConnell, 1987). نتایج حاصل از مطالعه تعداد ماهیان بیشترین میانگین ماهیان گیاهخوار *Thalassoma lunare*، در ایستگاه دو با $80(\pm 71/24)$ عدد بر کیلومترمربع تخمین زده شد. اما دو گونه از طوطی ماهیان *S. persicus* و *Scarus*

نقشی جداگانه برای آنها می‌توان تصور نمود. به‌علاوه، دو گونه از Apogonidae (*Cheilodipterus*) و *novemstriatus* و *C. quinquelineatus*، در میان خارهای توتیای خار بلند (*Diadema* sp.) پراکنش دارند و تغذیه و همزیستی خاصی بین آنها مشاهده می‌شود. ماهیان خانواده Pomacentridae در ستون آب پراکنده هستند و از ریز جلبک‌ها تغذیه می‌کنند و گونه‌های خانواده Blenniidae و Gobiidae با لانه‌های خاصی که از خرده مرجان‌ها بر روی بستر برای خود انتخاب نموده، به تغذیه روی بسترها پرداخته‌اند. انتخاب آشیانه‌های اکولوژیک هر یک از گروه‌های ماهیان گیاه‌خوار مذکور، ما را به این نتیجه‌گیری رهنمون می‌سازد که افزونگری عملکردی بیشتر از نقش مکمل عملکردی، در زیست‌بوم مرجانی جزیره هنگام مؤثر بوده باشد. البته مطالعات محققین نشان می‌دهد که نقش مکمل عملکردی در بین ماهیان گیاه‌خوار بیش از نقش افزونگری عملکردی باشد (Humphries et al., 2020). یافته‌ها نشان می‌دهد افزونگری عملکردی گونه‌های گیاه‌خوار در صخره‌ها بایستی پس از تخریب زیست‌بوم‌ها نگه‌داشته شود تا اینکه نقش مکملی عملکردی در گونه‌ها شکل‌پذیری خود را پیدا نماید (Nash et al., 2016). از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که در نقش مکمل‌های عملکردی گونه‌ها وجود دارد، نشان داده است که اجتماعات ماهیان ساکن در یک زیست‌بوم، برخی از این نقش‌های عملکردی را نمی‌توانند انجام دهند که خود ممکن است بر آسنگ‌های مرجانی حاشیه‌ای تأثیر منفی داشته باشد (Coker et al., 2014). در خصوص گونه‌های گیاه‌خوار بیان شده است که حتی اگر برخی از این گونه‌ها حذف شوند، به دلیل فراوانی گونه‌های عملکردی، دیگر نقش محافظتی خود را در این نوع زیست‌بوم‌ها می‌توانند انجام دهند (Green and Bellwood, 2009). بازنگری مطالعات سایر محققین نشان می‌دهد که نقش‌های عملکردی ماهیان گیاه‌خوار در مکان‌های جغرافیایی متفاوت است. ماهیان گیاه‌خوار با توجه به نقش‌های تغذیه‌ای یا رفتاری به گروه‌های مختلفی تقسیم گردیده است که با عملکردهای خاص زیست‌بوم مطابقت دارند و بیان شده است که این گروه‌های عملکردی شامل زیرمجموعه‌ای از گونه‌ها هستند که بدون

(ghobban) دارای بیشترین حضور در تمامی ایستگاه‌ها بودند. همچنین با توجه به طول بی‌نهایت، گزارش شده است که افراد خانواده طوطی ماهیان با تغذیه از صخره‌های بزرگ به صورت دسته‌جمعی در پاک‌سازی محیط مؤثرند (Dell et al., 2020; Shimose et al., 2022). در جزیره هنگام این نقش علاوه بر طوطی ماهیان، در جراح ماهی دم‌قچی (*Acanthurus sohal*)، مشاهده شد، هرچند توأم با قلمرو طلبی بوده است. در خصوص ماهی صافی موج (*Siganus javus*) در ایستگاه‌های یک، سه و پنج بررسی رفتارهای تغذیه چهار گونه از صافی ماهی این جنس در جزیره سیشل نشان داد که *Siganus argenteusa* و *S. sutor* گیاه‌خواران عمومی هستند و از ماکرو جلبک‌ها، علف‌های دریایی و جلبک‌های رورست (Epiphytic algae)، تغذیه می‌کنند درحالی‌که *S. corallinus* و *S. stellatus*، در تغذیه گیاه‌خواری خود اختصاصی عمل کرده و از جلبک‌های رورست که روی بستر صخره رشد نموده تغذیه می‌کند (Dell et al., 2020). مطالعه جمعیت‌های ماهیان گیاه‌خوار برای درک تأثیر تجمعی آنها بر سلامت آسنگ‌های مرجانی ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، در مشاهدات زیر آب نتیجه‌گیری گردید که گونه پیکاسو (*Rhinecanthus assasi*) هرچند یک گونه گیاه‌خوار خاص نیست، نقش مهم‌تری ایفا می‌کند و با کندن رشته‌های جلبکی از روی سطوح صخره‌ها منجر به تمیزی صخره‌ها می‌گردد. شاید نکته قابل‌توجه پراکنش این گونه در اعماق بالاتر از سایر گونه‌ها باشد (۱۵-۱۰ متر) که با توجه به پدیده گرمایش زمین، نقش آنها در فراهم نمودن فضای مناسب جهت نشست لارو مرجان‌ها (پلانولا)، نقش برجسته‌ای تلقی می‌گردد. گونه *Melichthys niger* از این خانواده نقش مهمی در برداشت جلبک‌های بزرگ در صخره‌های Caribbean داشته است (Tebbett et al., 2020). در خصوص سایر خانواده‌ها (Pomacentridae, Apogonidae, Blenniidae, Caesionidae, Chaetodontidae, Gobiidae, Labridae, Pomacanthidae و Ostraciidae)، شاید آنچه به‌وضوح بتوان عنوان نمود، هر یک از آنها در آشیانه اکولوژیک خود زیست می‌کنند و وابسته به آشیانه‌های خاصی هستند و

مؤثر باشد. به علاوه، هرچند نقش ماهیان گیاه‌خوار به عنوان گروه‌های عملکردی در این پژوهش مطالعه شد، در کنار آنها از نقش سایر بی‌مهرگان و خارپوستان این زیست‌بوم مانند خیار دریایی به عنوان چرا کنندگان و فیلتر کنندگان نباید نادیده انگاشته شود. این پژوهش با توجه به کاستی‌هایی که بر آن وارد است، اولین مطالعه در خصوص ماهیان گیاه‌خوار در زیست‌بوم‌های مرجانی خلیج فارس بوده است که به ارزیابی نقش اکولوژیک این گروه از ماهیان در آینده زیستی زیست‌بوم‌های مرجانی می‌پردازد و انتظار می‌رود که محققان این ارزیابی را در سایر جزایر شمالی خلیج فارس ادامه دهند.

تشکر و قدردانی

تیم تحقیقاتی بر خود لازم می‌داند از دکتر محمد صدیق مرتضوی و دکتر سیده لیلی محبی ریاست و معاونت محترم پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین ریاست محترم وقت شیلات جزیره قشم مهندس محمد پرورش به واسطه مساعدت‌ها در طول انجام این تحقیق تشکر و قدردانی نماید.

این پژوهش با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به شماره قرارداد ۹۸۰۲۰۴۸۷ انجام شده است.

منابع

بهزادی، س.، درویشی، م.، سالارپوری، ع. و مؤمنی، م.، ۱۳۷۶. بررسی ذخایر ماهیان گرگوری جزیره ابوموسی. گزارش نهایی، مؤسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران، ۱۰۶ صفحه.

بهزادی، س.، درویشی، م.، سالارپوری، ع.، اکبرزاده، غ.ع.، وهاب نژاد، آ.، صیدمرادی، ش. و محبی نوذر، س.پ.، ۱۳۹۸. ارزیابی تنوع زیستی ماهیان در زیستگاه‌های مصنوعی خلیج فارس (استان هرمزگان، بنادر سلخ و بستانه). نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی، ۷(۳): ۴۵-۵۸.

بهزادی، س.، سالارپوری، ع.، درویشی، م.، اکبرزاده چماچانی، غ.ع.، پورمظفر، س. و گذری، م.، ۱۳۹۸. برآورد زی‌توده سرپا ماهیان زینتی و صخره‌ای جزیره

توجه به روابط بین آنها، عملکردهای مشابهی انجام می‌دهند (Green and Bellwood, 2009). البته ایفاء نمودن این دو نقش (مکمل عملکردی یا افزونگری عملکردی)، در بین گونه‌ها ممکن است بسیار از نظر زمانی، مکانی یا منابع قابل دسترس متفاوت باشد. از سوی دیگر، ارجحیت غذائی ممکن است بسیار به منابع قابل دسترس متکی باشد (Hanmer et al., 2017). از این منظر، بسیاری از این ماهیان در هر زیست‌بوم ممکن است نقش‌های متفاوتی ایفاء نمایند. نشان داده شده است که گیاه‌خواران دارای تنوع زیاد در دینامیک غذایی هستند و از نظر اکولوژی نقش‌های متفاوتی ایفاء می‌کنند (Humphries et al., 2020). اما آنچه روشن است ماهیان گیاه‌خوار در زیست‌بوم‌های مرجانی با کاهش پوشش جلبکی، سلامت آبسنگ‌های مرجانی را فراهم می‌کنند و در عین حال باعث بقاء و رشد مرجان‌های موجود می‌شوند (Burkepile and Hay, 2008)، تنوع در رژیم گیاه‌خواری، انعطاف‌پذیری آبسنگ‌های مرجانی را ارتقاء می‌دهد که قابلیت مقاومت و بازسازی مرجان‌ها را پس از تخریب توسعه می‌بخشد (Hodgson et al., 2015). همچنین در بررسی ساختار طولی اجتماعات ماهیان گیاه‌خوار در زیست‌بوم‌های مرجانی جزیره هنگام تفاوت در اندازه دو گونه طوطی ماهی زرد پولک (*Scarus ghobban*) با میانگین طولی ۳۲/۵ سانتی‌متر و ماهی بلنی خلیج (*Ecsenius pulcher*) با ۶ سانتی‌متر، فراوانی در گونه‌ها و ارجحیت انتخاب آشیانه‌های اکولوژیک در این پژوهش نتیجه‌گیری شد. عنوان شده است که به دلیل تنوع در اندازه، فراوانی و رفتار تغذیه‌ای، این ماهی‌ها اغلب به عنوان عوامل کلیدی در حفظ سلامت آبسنگ‌های مرجانی محسوب می‌گردند (Hughes et al., 2010). نتایج حاصل از ارزیابی روند زمانی و مکانی تغییرات تعداد ماهیان گیاه‌خوار، نشان داد که هر یک از خانواده‌های ماهیان گیاه‌خوار آشیانه اکولوژیک مجزا برای خود انتخاب می‌کنند به نحوی که این آشیانه‌ها حضور آنها را در پیرامون جزیره هنگام تحت الشعاع خود قرار داده است. هر یک از گروه‌های ماهیان گیاه‌خوار با انتخاب آشیانه‌های اکولوژیک مجزا در جزیره هنگام نشان داد که افزونگری عملکردی بیشتر از نقش مکمل عملکردی در این زیست‌بوم می‌تواند

- and Allemand, D., 2021. Noise pollution on coral reefs? A yet underestimated threat to coral reef communities. *Marine Pollution Bulletin*, 165, 112129. Doi:10.1016/j.marpolbul.2021.112129
- Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO species identification sheets for fishery purposes: Western Indian Ocean (Fishing Area 51). v. 1: Introductory material. Bony fishes, families: Acanthuridae to Clupeidae.-v. 2: Bony fishes, families: Congiopodidae to Lophotidae.-v. 3:... families: Lutjanidae to Scaridae.-v. 4:... families: Scatophagidae to Trichiuridae.-v. 5: Bony fishes, families: Triglidae to Zeidae. Chimaeras. Sharks. Lobsters. Shrimps and prawns. Sea turtles. v. 6: Alphabetical index of scientific names and vernacular names.
- Green, A.L. and Bellwood, D.R., 2009. Monitoring functional groups of herbivorous reef fishes as indicators of coral reef resilience: a practical guide for coral reef managers in the Asia Pacific region (No. 7). IUCN.
- Hanmer, J. White, J.W. and Pawlik, J.R., 2017. Application of diet theory reveals context dependent foraging preferences in an herbivorous coral reef fish. *Oecologia*, 185: 127-137. Doi: 10.1007/s00442-017-3855-y.
- Hodgson, D., McDonald, J.L. and Hosken, D.J., 2015. What do you mean, 'resilient'? *Trends in Ecology and Evolution*, 30(9), 503-506. Doi: 10.1016/j.tree.2015.06.010.
- Hosseinzadeh Sahafi, H., 2000. Identification of marine ornamental fishes in northern part of the Persian Gulf, Iran. *Iranian Journal of Fisheries Sciences*, 2(2): 21-36.
- لارک، خلیج فارس. علوم و فنون شیلات، ۹(۱): ۳۷-۳۱.
- علی عسگری، ا.، دهقانی، ح. و قیم اشرفی، د.، ۱۳۹۱. شناسایی مرجانهای سخت جزیره هنگام در خلیج فارس راسته (Scleractinia)، فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی جانوری، ۵(۲): ۴۷-۶۱.
- Adam, T.C., Burkepille, D.E., Holbrook, S.J., Carpenter, R.C., Claudet, J., Loiseau, C., Thiault, L., Brooks, A.J., Washburn, L. and Schmitt, R.J., 2021. Landscape-scale patterns of nutrient enrichment in a coral reef ecosystem: implications for coral to algae phase shifts. *Ecological Applications*, 31(1): e2227.
- Burkepille, D.E. and Hay, M.E., 2008. Herbivore species richness and feeding complementarily affect community structure and function on a coral reef. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(42): 1620-16206. Doi:10.1073/pnas.0801946105.
- Coker, D.J., Wilson, S.K. and Pratchett, M.S., 2014. Importance of live coral habitat for reef fishes. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 24(1): 89-126. Doi:10.1007/s11160-013-9319-5.
- Dell, C.L., Longo, G.O., Burkepille, D.E. and Manfrino, C., 2020. Few herbivore species consume dominant macroalgae on a Caribbean coral reef. *Frontiers in Marine Science*, 7, 676 P. Doi:10.3389/fmars.2020.00676.
- Emslie, M.J., Cheal, A.J., MacNeil, M.A., Miller, I.R. and Sweatman H.P.A., 2018. Reef fish communities are spooked by scuba surveys and may take hours to recover. *PeerJ* 6:e4886. <https://doi.org/10.7717/peerj.4886>.
- Ferrier-Pagès, C., Leal, M.C., Calado, R., Schmid, D.W., Bertucci, F., Lecchini, D.

- Hughes, T.P., Graham, N.A., Jackson, J.B., Mumby, P.J. and Steneck, R.S., 2010.** Rising to the challenge of sustaining coral reef resilience. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(11): 633-642. Doi: 10.1016/j.tree.2010.07.011.
- Humphries, A.T. McClanahan, T.R. and McQuaid, C.D., 2020.** Algal turf consumption by sea urchins and fishes is mediated by fisheries management on coral reefs in Kenya. *Coral Reefs*, 39(4): 1137-1146. Doi: 10.1007/s00338-020-01943-5.
- McConnell, R. and Lowe-McConnell, R.H., 1987.** Ecological Studies in the in Tropical Fish Communities. Cambridge University Press, Cambridge, 382 p. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511721892>.
- Messmer, V. Jones, G.P. Munday, P.L. Holbrook, S.J. Schmitt, R.J. and Brooks, A.J., 2011.** Habitat biodiversity as a determinant of fish community structure on coral reefs. *Ecology*, 92(12): 2285-2298. Doi: 10.1890/11-0037.1
- Munday, P.L., 2004.** Habitat loss, resource specialization, and extinction on coral reefs. *Global Change Biology*, 10(10): 1642-1647.
- Nash, K.L., Graham, N.A.J., Jennings, S., Wilson, S.K. and Bellwood, D.R., 2016.** Herbivore cross-scale redundancy supports response diversity and promotes coral reef resilience. *Journal of Applied Ecology*, 53(3), pp.646-655. Doi: 10.1111/1365-2664.12430.
- Randall, J.E. and Hoover, J.P., 1995.** Coastal Fishes of Oman. University of Hawaii Press, Hawaii. USA. 439 P.
- Ribas-Deulofeu, L., Denis, V., Château, P.A. and Chen, C.A., 2021.** Impacts of heat stress and storm events on the benthic communities of Kenting National Park (Taiwan). *PeerJ*, 9: p.e11744. Doi: 10.7717/peerj.11744.
- Samoilys, M.A. and Carlos, G., 2000.** Determining methods of underwater visual census for estimating the abundance of coral reef fishes. *Environmental Biology of Fishes*, 57(3): 289-304.
- Shimose, T., Kanaiwa, M. and Ebisawa, A., 2022.** Estimation of the optimal regulation size considering bid price increase with growth in size selectable coral reef fisheries. *Marine Policy*, 137, p.104961. Doi: 10.1016/j.marpol.2022.104961
- Smith, J.L.B. Smith, M.M. and Heemstra, P.C., 2003.** Smiths' sea fishes. *Johannesburg, Macmillan*, pp.404-406. Doi: 10.1007/978-3-642-82858-4
- Souter, D., Serge, P., Wicquart, J., Logan, M., Obura, D. and Staub, F., 2021.** Status of coral reefs of the world: 2020. *Global Coral Reef Monitoring Network; International Coral Reef Initiative, Australian Institute of Marine Science: Townsville, Australia*. 67(4): 209-223.
- Tebbett, S.B., Hoey, A.S., Depczynski, M., Wismer, S. and Bellwood, D.R., 2020.** Macroalgae removal on coral reefs: realised ecosystem functions transcend biogeographic locations. *Coral Reefs*, 39(1): 203-214. Doi: 10.1007/s00338-019-01874-w.
- Willis, T.J., 2001.** Visual census methods underestimate density and diversity of cryptic reef fishes. *Journal of Fish Biology*, 59(5), pp.1408-1411.

Spatial and temporal changes of fishes in coral community (Hangam Island, Persian Gulf)

Behzadi S.^{1*}; Salarpouri A.¹; Dehghani R.¹; Akbarzadeh Gh.A.¹; Gozari M.¹; Esmaili H.R.²

*behzadi@pgoseri.ac.ir

1-Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute Agricultural Research Education and Extension Organization, Bandar Abbas, Iran

2-Department of Biology, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

Abstract

In this research, the frequency of coral fishes from Hengam Island were studied seasonally from summer of 2020 to the spring of 2021 by Underwater Visual Census (UVCm) and belt transect method. A total of 38 species were identified in five selected stations, of which 31 species were herbivorous fishes, Pomacentridae and Labridae families had the highest frequency with 7 and 4 species. The abundance of herbivorous fish *Thalassoma lunare* was estimated at 80(±71) number per square kilometer in station two. In addition, two species of parrotfish (*Scarus persicus* and *Scarus ghobban*) were the most frequent in all stations. The highest seasonal frequency of herbivorous fishes was recorded at station 2 in winter 58(±12) numbers per square kilometer and the lowest at station 3 in summer 5(±21) numbers per square kilometer. The seasonal abundance of herbivorous fishes were significantly differ between stations, except in summer ($p < 0.05$). The temporal and spatial changes in the abundance of herbivorous fish in the stations indicate the importance of selective performance of fishes for ecological niche. In this regard, the role of functional redundancy is more effective than the role of functional complement among these fishes in the biological future of the coral communities of Hengam Island. Therefore, it is recommended to protect the coral fish stock of the island.

Keywords: Coral fishes, Abundance, Function, Hengam Island, Persian Gulf

*Corresponding author