

بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (*Stichopus hermanni*) جمع آوری شده از خلیج فارس

زهرا سالاری^۱، ایمان سوری نژاد^{۱*}، ملیکا ناظمی^۲، مرتضی یوسف زادی^۳ و^۴

*Sourinejad@hormozgan.ac.ir

- ۱- گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 - ۲- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 - ۳- گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 - ۴- گروه فناوری های نوین، مرکز پژوهشی جنگل های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
- تاریخ دریافت: خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پذیرش: دی ۱۳۹۶

چکیده

خیارهای دریایی تولید کننده انواع مختلفی از ترکیبات طبیعی زیست فعال به ویژه متابولیت های ثانویه از جمله ساپونین می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (*Stichopus hermanni*) جمع آوری شده از خلیج فارس در برابر برخی باکتری های گرم مثبت و منفی بود. ابتدا عصاره گیری با اتانول ۷۰٪ انجام شد و به منظور جداسازی ساپونین، عصاره اتانولی تغلیظ شده بر روی ستون کروماتوگرافی با سیستم های حلالی مختلف شستشو داده شد. ساپونین با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC و HPTLC) شناسایی شد و با استفاده از روش رقت لوله ای حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) ساپونین تعیین گردید. دو دسته ساپونین استروئیدی و گلیکوزیدی در فرکشن های استخراج شده با کروماتوگرافی لایه نازک به ترتیب با R_f برابر با ۰/۹ و ۰/۰۵ شناسایی شد. تشخیص نمونه ای از ترکیب ساپونین استخراج شده توسط دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا نیز بیانگر تایید حضور ساپونین در خیار دریایی با توجه به R_f بدست آمده بود. از نظر میزان MIC، باکتری گرم منفی *Pseudomonas aeruginosa* دارای بیشترین مقاومت نسبت به ساپونین استروئیدی و ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی به ترتیب با MIC برابر با ۵۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر بود. ساپونین های استروئیدی و گلیکوزیدی-استروئیدی بر باکتری گرم منفی *Pseudomonas aeruginosa* هیچ فعالیت باکتریوسیدی نشان ندادند و در بین باکتری های گرم مثبت نیز بیشترین اثر کشندگی میزان مربوط به ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی در *Staphylococcus aureus* با MBC برابر با ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر بود. بالاتر بودن MIC در باکتری های گرم منفی مورد آزمایش، تایید کننده خاصیت ضد باکتریایی کمتر ساپونین استروئیدی و گلیکوزیدی استخراج شده خیار دریایی *Stichopus hermanni* در این باکتری ها نسبت به انواع گرم مثبت می باشد.

لغات کلیدی: خیار دریایی *Stichopus hermanni*، ساپونین استروئیدی، حداقل غلظت مهار کنندگی، باکتری های گرم منفی

*نویسنده مسئول

مقدمه

ترکیبات طبیعی زیست فعال موجود در جانداران دریازی را می توان به عنوان یک منبع غنی با کاربردهای غذایی، دارویی و پزشکی استفاده نمود. این ترکیبات دارای فعالیت های زیستی از گروه های مختلف جانوری از جمله مرجان ها، خرچنگ ها، خزeshکلان، خارپوستان، آبفشان ها، ماهی ها و اسفنج ها قابل جداسازی هستند (Yasoda et al., 2015; Datta et al., 2006). در مناطق حاره ای وجود تنوع و تراکم گونه ای زیاد و رقابت بر سر فضا، غذا و دفاع از خود منجر به تولید ترکیبات طبیعی زیست فعال توسط گروه های مختلف جانوری بیان شده، می شود. موجودات دریایی کم تحرک و یا فاقد تحرک مثل خیارهای دریایی که تحت تاثیر انواع مختلف میکروب ها قرار دارند از این نوع دفاع شیمیایی ضدباکتریایی به عنوان یک راهکار قابل اطمینان برای دفاع از خود استفاده می کنند. ترکیبات طبیعی زیست فعال را می توان به متابولیت های اولیه، متابولیت های ثانویه و پلیمرهای با وزن مولکولی بالا طبقه بندی کرد (Jha and Zi-Rong, 2004). متابولیت های ثانویه نقش کلیدی را در دفاع از میزبان در برابر عوامل بیماری زا، انگل ها، شکارچیان و رقیبان ایفا می کنند (Zapata and Amemiya, 2000) و به منظور برقراری ارتباط با موجودات هم گونه و محیط نیز استفاده می گردند (Datta et al., 2015).

ساپونین ها مهم ترین و فراوان ترین متابولیت های ثانویه موجود در خیار دریایی هستند (Caulier et al., 2011). این محصولات طبیعی دارای طیف گسترده ای از فعالیت های بیولوژیکی مانند فعالیت های سیتوتوکسیک، ضد آسم و اگزما، ضدالتهاب، ضدآرتريت، آنتی اکسیدان، ضد دیابت، ضدباکتری، ضد ویروس، ضدسرطان، ضدقارچ و غیره می باشند (بحرودی و همکاران، ۱۳۹۳؛ دیبا و همکاران، ۱۳۹۵؛ Sarhadizadeh et al., 2014). در حال حاضر عوامل میکروبی یکی از شایع ترین عوامل بیماری زای انسانها هستند. به منظور مهار و از بین بردن عوامل میکروبی باید از آنتی بیوتیک ها استفاده نمود که هر کدام با مکانیسم های متفاوتی وارد عمل می شوند (Andersson, 2003). از سویی، استفاده گسترده از

آنتی بیوتیک ها موجب افزایش مقاومت عوامل بیماری زا به آنها می شود لذا جستجو برای مواد ضد میکروبی جدید از منابع دیگر از جمله منابع طبیعی دریایی گسترش پیدا نموده است. کشور ما در مناطق خلیج فارس و دریای عمان به عنوان یک منبع غنی از گونه های مختلف خیار دریایی می باشد لذا مطالعه و بررسی کاربردهای دارویی عصاره خیار دریایی امری مهم به نظر می رسد. خیار دریایی *Stichopus hermanni* که از نظر رده بندی جزء راسته *Aspidochirotida* و رده *Holothuroidea* می باشد، گونه غالب در جزایر مرجانی در خلیج فارس از جمله لارک است (Afkhami et al., 2012). با توجه به حضور این گونه در سواحل جنوبی کشور و اهمیت شناسایی ترکیبات زیست فعال موجود در آنها، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر ضدباکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی *Stichopus hermanni* جمع آوری شده از خلیج فارس می باشد.

مواد و روش کار

نمونه برداری، استخراج و جداسازی ساپونین از خیار دریایی

نمونه های خیار دریایی گونه *S. hermanni* از عمق ۱۲-۵ متری آب های جزیره لارک در خلیج فارس جمع آوری شدند. برای آماده سازی نمونه ها و انجام عمل عصاره گیری، ابتدا تخلیه حفره شکمی صورت گرفت و عضلات دیواره بدن در اندازه های یک سانتی متری بریده شدند (Farjami et al., 2014). نمونه های خیار دریایی به مدت ۴۸ ساعت در دستگاه فریز درایر قرار گرفتند تا کاملاً خشک شوند و سپس پودر شدند. به منظور استخراج ترکیبات، به پودرهای تهیه شده اتانول ۷۰٪ اضافه شد و به مدت ۷۲ ساعت در آزمایشگاه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. محلول به دست آمده از صافی عبور داده شد تا ذرات معلق خیار دریایی از آن جدا شده و حلال اتانولی حاوی ترکیبات باقی بماند. عصاره به دست آمده به منظور حذف کامل حلال، تحت فشار کم به دستگاه روتاری مجهز به پمپ قوی در دمای ۴۰ درجه و دور ۱۴۵ وارد شد (Duan et al., 2006). فرایند تبخیر ۸ روز کاری زمان

های تغییر رنگ داده شده نیز با استفاده از رابطه ذیل محاسبه شد:

فاصله طی شده لکه از مبدأ / فاصله طی شده حلال از مبدأ $R_f =$

همچنین نمونه‌ای از ترکیب جدا شده‌ای که به رنگ بنفش درآمد بود (فرکشن شماره ۴۵ (ان‌هگزان ۱۰: اتیل‌استات ۳۰)) و فرکشن شماره ۳۰ (ان‌هگزان ۲۰: اتیل‌استات ۳۰)) به آزمایشگاه جامع دانشگاه شهید بهشتی ارسال شد تا با دستگاه کروماتوگرافی لایه‌نازک با کارایی بالا (HPTLC) که از نمونه استاندارد ساپونین استفاده می‌کند با دقت بیشتر آنالیز و شناسایی شود.

بررسی خواص ضدباکتریایی ساپونین

بررسی خواص ضدباکتریایی با استفاده از روش رقت لوله-ای (Bacterial Broth Dilution Methods) انجام گرفت. سوبه‌های باکتری *Bacillus subtilis* PY 79، *Pseudomonas*، *Bacillus cereus* ATCC 11778، *aeruginosa* ATCC 27853 و *Staphylococcus aureus* از مرکز کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی ایران به‌صورت لیوفیلیزه تهیه شد. پس از کشت باکتری‌ها از کلونی‌های تک ایجاد شده با استفاده از لوله مک‌فارلند ۰/۵ که برابر با 1×10^8 CFU/ml می‌باشد باکتری تهیه شد. سپس به منظور کاهش تعداد باکتری‌ها برای آزمایش رقت لوله‌ای به نسبت $1/5 \times 10^6$ رقیق‌سازی انجام شد.

جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتریایی (Minimum Inhibitory Concentration) MIC توسط ساپونین خیار دریایی، از لوله فوق که حاوی $1/5 \times 10^6$ باکتری بود به مقدار یک میلی‌لیتر به هر کدام از لوله‌های استریل اضافه گردید. سپس از ساپونین با غلظت-های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر که در محیط برات حل شده بود، مقدار یک میلی‌لیتر به لوله‌های فوق افزوده شد. برای در نظر گرفتن شاهد مثبت از آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین با غلظت‌های فوق استفاده گردید و به عنوان شاهد منفی به یکی از لوله‌ها ماده فعال بیولوژیک اضافه نشد. در داخل

برد که علت آن وجود ۳۰ درصد آب در حلال بود. پس از کم شدن حجم حلال، به منظور دست یابی به عصاره خشک از فریز درایر در دمای ۷۰- درجه سانتی‌گراد استفاده گردید.

ده گرم از عصاره اتانولی تهیه شده روی ستون کروماتوگرافی با ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر حاوی سیلیکاژل ۶۰ شرکت Merck قرار داده شد. شست و شوی ستون برای جداسازی ترکیبات عصاره با استفاده از حلال‌های آلی ان-هگزان: اتیل‌استات با نسبت (۵۰:۵، ۴۵:۵، ۴۰:۱۰، ۳۵:۱۵، ۳۰:۲۰، ۲۵:۲۵، ۲۰:۳۰، ۱۵:۳۵، ۱۰:۴۰، ۵:۴۵) و اتیل‌استات: ان‌بوتانول با نسبت (۵۰:۵، ۴۵:۵، ۴۰:۱۰، ۳۵:۱۵، ۳۰:۲۰، ۲۵:۲۵، ۲۰:۳۰، ۱۵:۳۵، ۱۰:۴۰، ۵:۴۵) به ترتیب افزایش قطبیت انجام شد (Çitoğlu and Acıkar, 2012). در نهایت ۱۱۰ فرکشن ۱۰ میلی‌لیتری به‌دست آمد.

شناسایی ساپونین با کروماتوگرافی لایه‌نازک (TLC) و کروماتوگرافی لایه‌نازک با کارایی بالا (HPTLC)

از کروماتوگرافی لایه‌نازک برای شناسایی اولیه و انتخاب فرکشن‌های حاوی ساپونین استفاده شد. از آنجا که ساپونین متعلق به ترپنوئیدها می‌باشد که با معرف وانیلین به رنگ بنفش تبدیل می‌گردد برای حذف سایر فرکشن‌ها که حاوی ترکیب ساپونین نمی‌باشند از این معرف استفاده گردید (Bahrami and Franco, 2015). برای جداسازی فرکشن‌های حاوی ساپونین، نمونه‌ها روی صفحات آلومینیومی پوشیده شده از یک لایه سیلیکاژل 60F₂₅₄ قرار گرفتند. سپس صفحات با حلال‌های کلروفرم: متانول: آب (۷:۱۳:۸) (به عنوان فاز متحرک) قرار داده شدند. برای شناسایی لکه‌های ساپونین از معرف وانیلین و سولفوریک‌اسید به شکل محلول پنج درصد سولفوریک-اسید در اتانول و محلول یک درصد وانیلین در اتانول استفاده شد. در نهایت صفحات به مدت ۱۵ دقیقه در آن ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند تا رنگ آن‌ها در نور مرئی آشکار گردد. رنگ بنفش نشانه وجود ترکیب ساپونین است (Sharma et al., 2012). میزان R_f لکه-


یک لوله نیز تنها محیط کشت فاقد ماده مؤثره و باکتری قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی خطای آزمایش مشخص گردد. سپس تمام لوله‌ها در انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شدند. شایان ذکر است، آزمایش ۳ بار تکرار شد. پس از ۲۴ ساعت لوله‌های آزمایشی که در آن کدورت ایجاد نشده بود و نشان‌دهنده حداقل غلظت بازدارنده رشد باکتری بود به منظور تعیین حداقل غلظت کشندگی از سایر لوله‌های مورد آزمایش جدا شد (Sökmen et al., 2003).

به منظور تعیین توانایی ساپونین‌های استخراج شده در از بین بردن باکتری‌ها، از لوله‌هایی که در آن‌ها کدورت مشاهده نشده بود به مقدار ۰/۱ میلی‌لیتر بر روی پلیت‌های محیط کشت جامد (نوترینت آگار) کشت خطی داده شد. سپس پلیت‌ها به انکوباتور منتقل شدند و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شدند. پس از سپری شدن این مدت تعداد کلونی‌های تشکیل شده (CFU) شمرده شد. در پلیت‌هایی که باکتری رشد کرده بود حاکی از آن است که ساپونین توانایی مهار رشد و تکثیر باکتری را دارد، اما در پلیت‌هایی که هیچ‌گونه کلونی مشاهده نشد نشان‌دهنده آن است که ماده مورد نظر سبب مرگ باکتری شده است؛ که این مقدار برابر با حداقل غلظت کشندگی (MBC) (Bactericidal Concentration) می باشد (Sökmen et al., 2003).

نتایج

آنالیز ساپونین با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)
ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس *S. hermanni* با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC و HPTLC) آنالیز شد (Bahrami and Franco, 2015). همانطوریکه شکل ۱ نشان می دهد، روی کروماتوگرافی لایه‌نازک طیفی از ساپونین در فرکشن‌های مختلف با توجه به رنگ بنفش و R_f تقریباً یکسان قابل مشاهده است. مشخصات مربوط به کروماتوگرافی لایه‌نازک در جدول ۱ ارائه شده است.

طبق نتایج بدست آمده از کروماتوگرافی لایه‌نازک فرکشن شماره ۳۰ تا ۳۵ یک لکه به رنگ بنفش-آبی با $R_f = 0/9$ را نشان می‌دهد. از آنجایی که R_f لکه آشکار شده در محدوده R_f ساپونین‌های استروئیدی می‌باشد، ترکیب موجود در این فرکشن‌ها ساپونین استروئیدی شناسایی شد. علاوه بر این در فرکشن‌های ۳۶ تا ۵۰ و ۶۱ تا ۶۵ دو لکه ظاهر شد که لکه شماره (۱) با رنگ بنفش و $R_f = 0/05$ می‌باشد و R_f لکه ظاهر شده در محدوده R_f ساپونین گلیکوزیدی می‌باشد و لکه دوم به رنگ بنفش تیره با $R_f = 0/82$ و $R_f = 0/84$ در محدوده R_f ساپونین استروئیدی می‌باشد. پس در این صورت در این فرکشن‌ها دو نوع ساپونین گلیکوزیدی و استروئیدی شناسایی شد (Wagner and Bladt, 1996). فرکشن‌هایی که لکه با رنگ و R_f یکسان داشتند با یکدیگر ترکیب شدند و میزان ۲ گرم ساپونین استروئیدی و ۳/۵ گرم ساپونین گلیکوزیدی -استروئیدی تهیه شد و سپس خواص ضدباکتریایی آن‌ها بررسی شد.




شکل ۱: کروماتوگرافی لایه نازک ساپونین استخراج شده از *S. hermanni*
Figure 1: TLC for Saponin extracted from *S. hermanni*

شناسایی ساپونین با کروماتوگرافی لایه‌نازک با کارایی بالا (HPTLC)
شناسایی ساپونین موجود در فرکشن شماره ۳۰ با کروماتوگرافی لایه‌نازک با کارایی بالا (HPTLC) در مورد فرکشن شماره ۳۰ پس از انتقال به دستگاه کروماتوگرافی لایه‌نازک با کارایی بالا، صفحات در معرض نور مرئی و نور UV با طول موج ۲۵۴ نانومتر قرار گرفتند و یک لکه با $R_f = 0/84$ ظاهر شد (شکل ۲).

جدول ۱: مشخصات مربوط به کروماتوگرافی لایه نازک ساپونین استخراج شده از *S. hermanni*Table 1: Characteristics of TLC for Saponin extracted from *S. hermanni*

شماره فرکشن	فاز متحرک	R _f	رنگ	شماره فرکشن	فاز متحرک	R _f	رنگ
۳۰	N*20:E*30	۰/۹۰	بنفش-آبی	(۱)۴۵	N10:E40	۰/۰۵	بنفش
۳۲	N20:E30	۰/۹۰	بنفش-آبی	(۲)۴۵	N10:E40	۰/۸۴	بنفش تیره
۳۳	N20:E30	۰/۹۰	بنفش-آبی	(۱)۴۶	N5:E45	۰/۰۵	بنفش
۳۴	N20:E30	۰/۹۰	بنفش-آبی	(۲)۴۶	N5:E45	۰/۸۴	بنفش تیره
۳۵	N20:E30	۰/۹۰	بنفش-آبی	(۱)۴۷	N5:E45	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۳۶	N15:E35	۰/۰۵	بنفش	(۲)۴۷	N5:E45	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۳۶	N15:E35	۰/۸۴	بنفش تیره	(۱)۴۸	N5:E45	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۳۷	N15:E35	۰/۰۵	بنفش	(۲)۴۸	N5:E45	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۳۷	N15:E35	۰/۸۴	بنفش تیره	(۱)۴۹	N5:E45	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۳۸	N15:E35	۰/۰۵	بنفش	(۲)۴۹	N5:E45	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۳۸	N15:E35	۰/۸۲	بنفش تیره	(۱)۵۰	N5:E45	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۳۹	N15:E35	۰/۰۵	بنفش	(۲)۵۰	N5:E45	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۳۹	N15:E35	۰/۸۲	بنفش تیره	(۱)۶۱	E45:NB*5	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۴۰	N15:E35	۰/۰۵	بنفش	(۲)۶۱	E45:NB5	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۴۰	N15:E35	۰/۸۲	بنفش تیره	(۱)۶۲	E45:NB5	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۴۱	N10:E40	۰/۰۵	بنفش	(۲)۶۲	E45:NB5	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۴۱	N10:E40	۰/۸۲	بنفش تیره	(۱)۶۳	E45:NB5	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۴۲	N10:E40	۰/۰۵	بنفش	(۲)۶۳	E45:NB5	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۴۲	N10:E40	۰/۸۴	بنفش تیره	(۱)۶۴	E45:NB5	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۴۳	N10:E40	۰/۰۵	بنفش	(۲)۶۴	E45:NB5	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۴۳	N10:E40	۰/۸۴	بنفش تیره	(۱)۶۵	E45:NB5	۰/۰۵	بنفش
(۱) ۴۴	N10:E40	۰/۰۵	بنفش	(۲)۶۵	E45:NB5	۰/۸۴	بنفش تیره
(۲) ۴۴	N10:E40	۰/۸۴	بنفش تیره				

* E: اتیل استات؛ N: ان هگزان؛ NB: ان بوتانول



الف ب

شکل ۲: HPTLC فرکشن شماره ۳۰: (الف) در معرض نور

مرئی؛ (ب) در معرض نور UV

از آنجایی که کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا با دقت بهتری از کروماتوگرافی لایه نازک عمل می کند، تشخیص نمونه ای از ترکیب ساپونین استخراج شده (فرکشن ۳۰) توسط دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا که از اطلاعات ذخیره شده نمونه استاندارد ساپونین در دستگاه جهت تأیید حضور ترکیب استفاده می نماید، بیانگر تأیید حضور ساپونین در خیار دریایی مورد مطالعه در این تحقیق با توجه به R_f بدست آمده بود.

بترتیب در غلظت ۴۰۰ و ۱۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر اثر باکتریوسیدی نشان داد.

جدول ۲: میزان MIC برای فرکشن حاوی ترکیبات ساپونین *S. hermanni* در باکتری‌های مورد آزمایش (میکروگرم بر میلی‌لیتر)

Table 2: MIC for Saponin compounds fraction of *S. hermanni* in test bacteria (mcg/ml).

سویه‌های باکتری	MIC ساپونین استروئیدی
<i>Staphylococcus aureus</i>	۲۰۰
<i>Bacillus cereus</i>	۱۰۰
<i>Bacillus subtiliss</i>	۴۰
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	۵۰۰

جدول ۳: میزان MBC برای فرکشن حاوی ترکیبات ساپونین *S. hermanni* در باکتری‌های مورد آزمایش (میکروگرم بر میلی‌لیتر)

Table 3: MBC for Saponin compounds fraction of *S. hermanni* in test bacteria (mcg/ml).


سویه‌های باکتری	MIC ساپونین استروئیدی
<i>Staphylococcus aureus</i>	-
<i>Bacillus cereus</i>	۴۰۰
<i>Bacillus subtilis</i>	۱۰۰
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-

خواص ضد باکتریایی ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی

بر اساس جدول ۴ میزان MIC برای ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی استخراج شده از خیار دریایی *S. hermanni* در باکتری گرم‌مثبت *S. aureus* برابر با ۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر، در باکتری گرم‌مثبت *Bacillus cereus* برابر با ۴۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر و در باکتری گرم‌مثبت *B. subtiliss* برابر با ۱۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر بوده است. علاوه بر این ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی در غلظت ۴۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر مانع از رشد باکتری گرم‌منفی *P. aeruginosa* گردید.

Figure 2: HPTLC for fraction no. 30: (A) visible light; (B) UV exposed.

شناسایی ساپونین موجود در فرکشن شماره ۴۵ با کروماتوگرافی لایه‌نازک با کارایی بالا (HPTLC) در مورد فرکشن شماره ۴۵ پس از انتقال به دستگاه کروماتوگرافی لایه‌نازک با کارایی بالا، صفحات در معرض نور مرئی و نور UV با طول موج ۲۵۴ نانومتر قرار گرفتند و دو لکه با $R_f = 0.21 - 0.82$ ظاهر شد (شکل ۳) که طبق اطلاعات ذخیره شده در دستگاه از نمونه ساپونین استاندارد، ساپونین شناسایی شد.



شکل ۳: HPTLC فرکشن شماره ۴۵: (الف) در معرض نور مرئی؛ (ب) در معرض نور UV

Figure 3: HPTLC for fraction no. 45: (A) visible light; (B) UV exposed

خواص ضد باکتریایی ساپونین استروئیدی

همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، میزان MIC برای فرکشن حاوی ترکیبات ساپونین استخراج شده از خیار دریایی *S. hermanni* در باکتری گرم‌مثبت *S. aureus* برابر با ۲۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر، در باکتری گرم‌مثبت *B. cereus* برابر با ۱۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر و در باکتری گرم‌مثبت *B. subtiliss* برابر با ۴۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر بوده است. علاوه بر این فرکشن حاوی ترکیبات ساپونین در غلظت ۵۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر مانع از رشد باکتری گرم‌منفی *P. aeruginosa* گردید. همان‌گونه که در جدول ۳ نشان داده شده است، فرکشن حاوی ترکیبات ساپونین بر باکتری گرم‌مثبت *S. aureus* و گرم‌منفی *P. aeruginosa* هیچ اثر کشندگی نشان نداد ولی بر باکتری‌های گرم‌مثبت *B. cereus* و *B. subtiliss*

باکتری *B. subtilis* ۴۰ میکرو گرم بر میلی لیتر به دست آمد. این آنتی بیوتیک در غلظت ۲۰۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر منجر به از بین رفتن باکتری گرم منفی *P. aeruginosa* شد (جدول ۷).

جدول ۶: میزان MIC آموکسی سیلین در باکتری های مورد آزمایش (میکرو گرم بر میلی لیتر)

Table 6: MIC for Amoxicillin in test bacteria (mcg/ml).

سویه های باکتری	MIC ساپونین استروئیدی
<i>Staphylococcus aureus</i>	۵۰
<i>Bacillus cereus</i>	۳۰
<i>Bacillus subtilis</i>	۱۰
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	۵۰۰

جدول ۷: میزان MBC آموکسی سیلین در باکتری های مورد آزمایش (میکرو گرم بر میلی لیتر)

Table 7: MBC for Amoxicillin in test bacteria (mcg/ml).

سویه های باکتری	MIC ساپونین استروئیدی
<i>Staphylococcus aureus</i>	۱۰۰
<i>Bacillus cereus</i>	۵۰
<i>Bacillus subtilis</i>	۴۰
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	۲۰۰

بحث

ساپونین یکی از ترکیبات زیست فعال موجود در خیار دریایی است که دارای خواص بیولوژیک ضد باکتریایی می باشد. به همین منظور در تحقیق حاضر به مطالعه فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس *S. hermanni* پرداخته شد. برای شناسایی اولیه انتخاب فرکشن های حاوی ساپونین ها، کروماتوگرافی لایه نازک مورد استفاده قرار گرفت. جهت شناسایی دقیقتر ساپونین و نوع آن از دستگاه HPTLC و اطلاعات ذخیره شده نمونه استاندارد ساپونین در این دستگاه استفاده شد. ضمن آنکه در کروماتوگرافی کاغذی که به روش دستی انجام شد نیز R_f به دست آمده موید حضور ساپونین بود که با آنالیز دستگاهی انجام شده تطابق داشت.

جدول ۴: میزان MIC برای ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی *S. hermanni* در باکتری های مورد آزمایش (میکرو گرم بر میلی لیتر).

Table 4: MIC for glycosides- steroidal Saponin of *S. hermanni* in test bacteria (mcg/ml).

سویه های باکتری	MIC ساپونین استروئیدی
<i>Staphylococcus aureus</i>	۵۰
<i>Bacillus cereus</i>	۴۰
<i>Bacillus subtilis</i>	۱۰
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	۴۰۰

بر اساس جدول ۵ میزان MBC ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی در باکتری های گرم مثبت *S. aureus* و *B. subtilis* به ترتیب برابر با ۵۰۰، ۱۰۰ و ۳۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر می باشد. همانطوریکه نتایج نشان می دهد ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی بر باکتری گرم منفی *P. aeruginosa* هیچ اثر کشندگی نشان نداد.

جدول ۵: میزان MBC ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی *S. hermanni* در باکتری های مورد آزمایش (میکرو گرم بر میلی لیتر)

Table 5: MBC for glycosides- steroidal Saponin of *S. hermanni* in test bacteria (mcg/ml).

سویه های باکتری	MIC ساپونین استروئیدی
<i>Staphylococcus aureus</i>	۵۰۰
<i>Bacillus cereus</i>	۱۰۰
<i>Bacillus subtilis</i>	۳۰۰
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-

خواص ضد باکتریایی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین آنتی بیوتیک تجاری آموکسی سیلین در غلظت یکسان با ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی مانع از رشد باکتری های گرم مثبت *S. aureus* و *B. subtilis* (به ترتیب غلظت ۵۰ و ۱۰ میکرو گرم بر میلی لیتر) شد (جدول ۶). میزان MIC این آنتی بیوتیک در باکتری های *B. cereus* و *P. aeruginosa* در جدول ۶ ارائه شده است.

علاوه بر این حداقل غلظت کشندگی آنتی بیوتیک تجاری آموکسی سیلین در باکتری *S. aureus* برابر با ۱۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر، در باکتری *B. cereus* ۵۰ و در

گلیکوزیدی-استروئیدی به ترتیب با MIC ۱۰۰ و ۳۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر بود.

با مقایسه اثر ضدباکتریایی ساپونین های استخراج شده از خیار دریایی *S. hermanni* و آنتی بیوتیک آموکسی سیلین بر باکتری گرم مثبت *S. aureus*، آموکسی سیلین اثر مهارکنندگی بهتری نشان داد. بعد از آن، ساپونین گلیکوزیدی با MIC ۵۰ نسبت به ساپونین استروئیدی با MIC ۲۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر مهارکنندگی بهتری بر رشد باکتری نشان دادند. اکثر عفونت های موجود در بیمارستان ها به علت شیوع باکتری های بیماری زا از قبیل *S. aureus* می باشد که قادرند برای مدت زمان طولانی زنده بمانند. نیمی از باکتری های *S. aureus* که در بیمارستان ها یافت شده اند به آنتی بیوتیک هایی مثل متیسیلین مقاوم اند (Selsted and Ouellette, 2005). بنظر می رسد به دلیل وجود سویه های باکتریایی مقاوم، نیاز به آنتی بیوتیک های سنتزی جایگزین وجود دارد. کشف ترکیبات ضد میکروبی طبیعی، می تواند به عنوان سلاح جدیدی برای مبارزه با این میکروارگانیسم های بیماری زا باشد.

در میان باکتری های گرم مثبت مورد مطالعه، *B. subtilis* حساسیت بیشتر و باکتری *S. aureus* حساسیت کمتری نسبت به اثر ضدباکتریایی ساپونین های استخراج شده از خیار دریایی *S. hermanni* از نظر MIC و MBC نشان دادند. Adibpour و همکاران (۲۰۱۴) فعالیت ضد-باکتریایی خیار دریایی *Holothuria leucospilota* را بر باکتری گرم مثبت *S. aureus* و *B. cereus* بررسی کردند. نتایج نشان داد عصاره خیار دریایی رشد باکتری *S. aureus* را مهار نموده اما هیچ اثر مهارکنندگی بر باکتری *B. cereus* ندارد (Adibpour et al., 2014). در مطالعه دیگری فعالیت های ضدقارچی و ضدباکتریایی عصاره های الکلی برخی گونه های خیار دریایی مانند *Actinopyga miliaris* و *Actinopyga echinites* و *Holothuria scabra* توسط Abraham و همکاران (۲۰۰۲) مورد بررسی قرار گرفت. این محققان دریافتند که به استثنای گونه باکتری *Bacillus sp.* سایر گونه ها مانند *Enterococcus*، *Aeromonas hydrophila*، *E. coli*

در مطالعه حاضر اثر ضدباکتریایی ساپونین های استخراج شده از خیار دریایی *S. hermanni* بر باکتری های پاتوژن انسانی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه بررسی خواص ضد-باکتریایی عصاره خیار دریایی می باشد، مزیت این تحقیق بررسی خواص ضدباکتریایی ماده مؤثره (ساپونین) موجود در خیار دریایی مورد مطالعه بود. با مقایسه اثر ضد-باکتریایی ساپونین های استخراجی بر باکتری گرم منفی *P. aeruginosa*، ساپونین گلیکوزیدی با MIC ۴۰۰ اثر بهتری نسبت به ساپونین استروئیدی نشان داد. آنتی-بیوتیک آموکسی سیلین نسبت به ساپونین گلیکوزیدی اثر کمتری نشان داد اما تأثیر آن بر باکتری گرم منفی *P. aeruginosa* برابر با ساپونین استروئیدی با MIC ۵۰۰ می باشد. ساپونین گلیکوزیدی و استروئیدی بر باکتری *P. aeruginosa* هیچ فعالیت باکتریوسیدی نشان ندادند اما حداقل غلظت کشندگی آنتی بیوتیک مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در غلظت ۲۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. با بررسی خواص ضدباکتریایی در باکتری گرم مثبت *B. cereus* می توان دریافت که ساپونین ها نسبت به آنتی بیوتیک آموکسی سیلین اثر بهتری نشان دادند به گونه ای که بیشترین اثر مهارکنندگی رشد به ترتیب برای ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی و سپس استروئیدی با MIC به ترتیب ۴۰ و ۱۰۰ بود. همینطور حداقل غلظت کشندگی برای ساپونین استروئیدی، گلیکوزیدی-استروئیدی و آنتی بیوتیک در باکتری گرم مثبت *B. cereus* به ترتیب برابر ۴۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر بود.

با مقایسه اثر ضدباکتریایی ساپونین ها بر باکتری گرم مثبت *B. subtilis* می توان دریافت که ساپونین گلیکوزیدی و آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با MIC ۱۰ میکروگرم بر میلی لیتر نسبت به ساپونین استروئیدی با غلظت ۴۰ میکروگرم بر میلی لیتر اثر ضدباکتریایی بهتری نشان دادند. ساپونین ها بر این باکتری اثر باکتریوسیدی نشان دادند به گونه ای که بعد از آموکسی سیلین، بیشترین اثر کشندگی به ترتیب متعلق به ساپونین استروئیدی و سپس

داد، اما باکتری *P. aeruginosa* نسبت به این عصاره مقاوم بود. همچنین عصاره متانولی نسبت به باکتری‌های *S. typhi* و *S. marcescens* در غلظت‌های ۳۰ و ۵۰ میلی گرم بر میلی لیتر اثر باکتریوسیدی از خود نشان داد. به عبارتی دیگر این عصاره منجر به مرگ باکتری *Escherichia coli* نمی شود. Mariana و همکاران (۲۰۰۹) فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی خیار دریایی *Stichopus badionotus* را با دو روش انتشار دیسک و broth macro dilution مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که عصاره متانولی خیار دریایی فعالیت ضد - باکتریایی علیه باکتری *S. aureus* داشته است. حداقل غلظت ممانعتی بر علیه سویه‌هایی با مقاومت کم برابر با ۳/۷۵ میلی گرم بر میلی لیتر و برای سویه های مقاوم برابر با ۷/۵۰ میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج بدست آمده در این تحقیق (بالتر بودن MIC ساپونین علیه باکتریهای گرم منفی نسبت به گرم مثبت) نیز حاکی از حساس تر بودن باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی بود. به دلیل وجود غشاهای خارجی احاطه کننده دیواره سلولی در باکتریهای گرم منفی منطقی به نظر می رسد که این باکتریها در برابر اثرات ضد باکتریایی ترکیب حساسیت کمتری از خود نشان می‌دهند. بنظر می‌رسد تفاوت های گزارش شده در خواص بیولوژیک گونه های مختلف خیارهای دریایی مانند اثرات ضد باکتریایی به علت وجود و نوع متابولیت‌های ثانویه ای می‌باشد که در شرایط مختلف اکولوژی، در فصول مختلف سال و مواجه با آلودگی میکروبی سنتز می‌گردند. در واقع متابولیت‌های ثانویه سلاح‌های شیمیایی هستند که آبریان مانند خیار دریایی برای ادامه حیات از آنها استفاده می‌کنند. بنابراین، این سیستم ایمنی ذاتی می-تواند به عنوان یک منبع بالقوه برای کشف ترکیبات ضد میکروبی در نظر گرفته شود.

منابع

بحرودی، س.، نعمت الهی، م.ع.، آقا صادقی، م.ر.،
ناظمی، م. و بهروز، ب.، ۱۳۹۳. بررسی اثر
سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی

S. Klebsiella pneumoniae *P.aeruginosa* sp.
S. typhi aureus و *Vibrio harveyi* گونه قارچ
آسپرژیلوس جداسازی شده از ماهی نسبت به عصاره‌های
آزمایش شده خیار دریایی حساس بودند. در جمع بندی
عنوان شد که پتانسیل ضد میکروبی این عصاره‌ها، احتمالاً
به دلیل حضور عوامل ضد میکروبی نظیر ساپونین‌های
استروئیدی در عصاره خیار دریایی است.
در پژوهشی دیگر Farjami و همکاران (۲۰۱۴) اثر ضد-
باکتریایی عصاره‌های متانولی، کلروفرمی و هگزانی
استخراج شده از بخش‌های دیواره، روده و گناد خیار
دریایی جمع آوری شده از خلیج فارس (*Holothuria*
leucospilota) را بر باکتری *Escherichia coli* مورد
بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که عصاره‌های متانولی
هیچ‌گونه اثر ضدباکتریایی نداشتند ولی عصاره‌های
کلروفرمی در غلظت‌های ۵ و ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر اثر
ضدباکتری نشان دادند. عصاره هگزانی استخراج شده از
بخش دیواره در غلظت‌های ۵ و ۱۰ و عصاره هگزانی روده
در غلظت‌های ۲/۵، ۵ و ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر از رشد
باکتری جلوگیری نمودند. عصاره هگزانی گناد در هیچ کدام
از غلظت‌های مورد بررسی اثر ضدباکتری نشان نداد. همه
عصاره‌های کلروفرمی و عصاره هگزانی دیواره در غلظت ۵
و عصاره هگزانی گناد در غلظت ۲/۵ میلی گرم در میلی-
لیتر کمترین غلظت بازدارندگی از رشد را داشتند. در بین
عصاره‌ها فقط عصاره هگزانی روده در غلظت ۱۰ میلی گرم
در میلی لیتر باعث مرگ باکتری شد. ناظمی و همکاران
(۱۳۹۵) به بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره‌های
متانولی و آبی دیواره بدن خیار دریایی گونه *Holothuria*
Leucospilota روی برخی از باکتری‌های بیماری‌زای
انسانی پرداختند. نتایج نشان داد عصاره آبی روی هیچ-
کدام از باکتری‌های مورد آزمایش اثر ضدباکتری از خود
نشان نداد. تنها عصاره متانولی نسبت به باکتری‌های مورد
آزمایش اثر باکتریواستاتیک از خود نشان داد. در این پروژه
عصاره متانولی نسبت به باکتری‌های گرم منفی
Escherichia coli، *Salmonella typhi* و *Serratia*
marcescens به ترتیب اثر باکتریواستاتیک در غلظت
های ۳۰، ۱۰ و ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر از خود نشان

- Opinion Microbial, 6(5): 452- 456. DOI: 10.1016/j.mib.2003.09.001.
- Bahrami, Y. and Franco, C.M.M., 2015.** Structure Elucidation of New Acetylated Saponins, Lessoniosides A, B, C, D, and E, and Non-Acetylated Saponins, Lessoniosides F and G, from the Viscera of the Sea Cucumber *Holothuria lesson*. Marine Drugs, 13: 597-617. DOI: 10.3390/md13010597.
- Caulier, G., Van Dyck, S., Gerbaux, P., Eeckhaut, I. and Flammang, P., 2011.** Review of Saponin diversity in sea cucumbers belonging to the family Holothuriidae. SPC Beche-de-Mer Information Bulletin, 31: 48-54.
- Çitoğlu, G.S. and Acikara, Ö.B., 2012.** Column Chromatography for Terpenoids and Flavonoids. Edited by Sasikumar Dhanarasu, 13 p.
- Datta, D., Talapatra, S. and Swarnakar, S., 2015.** Bioactive compounds from marine invertebrates for potential medicines-an overview. International Letters of Natural Sciences, 7: 42-61. DOI: 10.18052/www.scipress.com/ILNS.34.42.
- Duan, X.J., Zhang, W.W., Li, X.M. and Wang, B.G., 2006.** Evaluation of antioxidant property of extract and fractions obtained from a red alga, *Polysiphonia urceolata*. Food chemistry, 95(1):37-43. DOI: 10.1016/j.foodchem.2004.12.015.
- Farjani, B., Nematollahi, M., Moradi, Y. and Nazemi, M., 2014.** Derivation of گونه *Holothuria leucospilota* در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی شیلات ایران، ۲۳(۳): ۲۰-۱۱.
- دبیا، گ.، جمیلی، ش. و رمضانی، ا.، ۱۳۹۵.** بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی خیار دریایی گونه *Holothuria parva* در دو حالت خشک (آبدهی شده) و تازه. مجله علمی شیلات ایران، ۲۵(۴): ۸۷-۷۷.
- ناظمی، م.، مرادی، ی.، گذری، م.، لکزایی، ف. و کریمپور، م.، ۱۳۹۵.** بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره‌های متانولی و آبی دیواره بدن خیار دریایی گونه *Holothuria leucospilota* روی برخی باکتری‌های بیماریزای انسانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، ۲۳(۱): ۷۵-۸۲.
- Abraham, T.J., Nagarajan, J. and Shanmugam, S.A., 2002.** Antimicrobial substances of potential biomedical importance from holothurian species. Indian Journal of Marine Sciences, 31(2): 161-164. DOI: 123456789/4309.
- Adibpour, N., Nasr, F., Nematpour, F., Shakouri, A. and Ameri, A., 2014.** Antibacterial and antifungal activity of *Holothuria leucospilota* isolated from Persian Gulf and Oman Sea. Jundishapur Journal of Microbiology, 7(1): e8708. DOI: 10.5812/jjm.8708.
- Afkhami, M., Ehsanpour, M., Khazaali, A., Kamrani, E., Makhlesi, A. and Bastami, K.D., 2012.** Sea cucumber fisheries of Qeshm Island, Persian Gulf. SPC Beche-de-mer Information Bulletin, 32: 60-61.
- Andersson, D. L., 2003.** Persistence of antibiotic resistant bacteria. Current

- extracts from Persian Gulf sea cucumber (*Holothuria leucospilota*) and assessment of its antifungal effect. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 13(4): 785-795.
- Jha, R.K. and Zi-Rong, X., 2004.** Biomedical compounds from marine organisms. Marine Drugs, 2(3): 123-146. DOI: 10.3390/md203123.
- Mariana, N.S., Norfarrah, M.A., Nik, K.A.N.I., Yusoff, F.M. and Arshad, A., 2009.** Evaluating the antibacterial activity and in vivo assay of methanolic extract of *Stichopus badionotus*. International Journal of Pharmacology, 5(3): 228-231. DOI: 10.3923/ijp.2009.228.231.
- Sarhadizadeh, N., Afkhami, M. and Ehsanpour, M., 2014.** Evaluation bioactivity of a sea cucumber, *Stichopus hermanni* from Persian Gulf. European Journal of Experimental Biology, 4(1): 254-258.
- Selsted, M.E. and Ouellette, A.J., 2005.** Mammalian defensins in the antimicrobial immune response. Nature immunology, 6(6): 551. DOI: 10.1038/ni1206.
- Sharma, O.P., Kumar, N., Singh, B. and Bhat, T.K., 2012.** An improved method for thin layer chromatographic analysis of Saponins. Food chemistry, 132: 671-674. DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.10.069.
- Sökmen, A., Vardar-Ünlü, G., Polissiou, M., Daferera, D., Sökmen, M. and Dönmez, E., 2003.** Antimicrobial activity of essential oil and methanol extracts of *Achillea sintenisii* Hub. Mor.(Asteraceae). Phytotherapy Research, 17(9): 1005-1010. DOI: 10.1002/ptr.1274.
- Wagner, H. and Bladt, S., 1996.** Plant drug analysis: a thin layer chromatography atlas. Springer Science and Business Media, 384 p.
- Yasoda, H.N., Chi, Z. and Zhu, K., 2006.** Probiotics and sea cucumber farming. SPC Bechedemer Information Bulletin, 24: 45-48.
- Zapata, A. and Amemiya, C.T., 2000.** Phylogeny of lower vertebrates and their immunological structures. Current Topics in Microbiology and Immunology, chapter: Origin and Evolution of the Vertebrate Immune System, 248: 67-107. DOI: 10.1007/978-3-642-59674-2-5.

Antibacterial activity of Saponin extracted from the sea cucumber (*Stichopus hermanni*) collected from the Persian Gulf

Salari Z.¹; Sourinejad I.^{1,4}; Nazemi M.²; Yousefzadi M.^{3,4}

*sourinejad@hormozgan.ac.ir

- 1- Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
- 2- Persian Gulf and Oman Sea Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institution, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Bandar Abbas, Iran
- 3- Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan Bandar Abbas, Iran
- 4- Department of Modern Technologies, Mangrove Forests Research Center, University of Hormozgan Bandar Abbas, Iran

Abstract

Sea cucumbers produce various bioactive compounds especially secondary metabolites including Saponin. The aim of this study was to investigate antibacterial activity of the Saponin extracted from the Persian Gulf sea cucumber (*Stichopus hermanni*) in some gram positive and negative bacteria. Extraction was first done by ethanol 70% and then Saponins were separated through column chromatography with silica gel. Extracted Saponins were identified through thin layer chromatography (TLC) and high performance thin layer chromatography (HPTLC). Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were investigated via tubular dilution. Two groups of steroidal and glycosides Saponins with R_f 0.9 and 0.05 were respectively identified in fractions extracted by TLC. HPTLC results for a sample of extracted Saponin confirmed the existence of Saponin in sea cucumber regarding the R_f . The gram negative bacterium *Pseudomonas aeruginosa* was the most resistant one to steroidal and glycosides- steroidal Saponins with MIC of 500 and 400 micg/ml, respectively. Steroidal and glycosides- steroidal Saponins showed no bactericidal effect in gram negative bacterium *Pseudomonas aeruginosa*. Among the gram positive bacteria, the highest MBC of 500 micg/ml belonged to glycosides- steroidal Saponin for *Staphylococcus aureus*. The higher MIC in gram negative bacteria approves the lower antibacterial property of the steroidal and glycosides Saponin extracted from sea cucumber *Stichopus hermanni* in these bacteria compared to the gram positive ones.

Keywords: Sea cucumber *Stichopus hermanni*, Steroidal Saponin, Minimum inhibitory concentration, Gram- negative bacteria

*Corresponding author